Marc Schönleber

Chirale P_2 - und P_1 -Liganden:
Synthese und Anwendungen in der
asymmetrischen Katalyse

Chirale *P,N*- und *P,P*-Liganden: Synthese und Anwendungen in der asymmetrischen Katalyse

Inauguraldissertation

zur Erlangung der Würde eines
Doktors der Philosophie

vorgelegt der
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Basel

von

Marc Schönleber
aus Deutschland

2005

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

1. Aufl. - Göttingen : Cuvillier, 2005

Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2005

ISBN 3-86537-555-3

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen 2005

Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen

Telefon: 0551-54724-0

Telefax: 0551-54724-21

www.cuvillier.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

1. Auflage, 2005

Gedruckt auf säurefreiem Papier

ISBN 3-86537-555-3

Genehmigt von der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel
auf Antrag von

Prof. Dr. A. Pfaltz

Prof. Dr. H. Wennemers

Basel, den 10. Mai 2005

Prof. Dr. H.-J. Wirz

Dekan

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre, dass ich die Dissertation “Chirale *P,N*- und *P,P*-Liganden: Synthese und Anwendungen in der asymmetrischen Katalyse“ nur mit der darin angegebenen Hilfe verfasst und bei keiner anderen Universität und keiner anderen Fakultät der Universität Basel eingereicht habe.

Basel, den 12. April 2005

M. Schönleber

in memoriam

D. Schönleber

Teile dieser Arbeit werden / wurden publiziert:

Chiral Bis(N-arylamino)phosphine-oxazolines: Synthesis and Application in Asymmetric Catalysis; M. Schoenleber, A. Pfaltz *Adv. Synth. Catal.*, Manuskript in Vorbereitung.

Method for producing orthometalated and orthosubstituted aromatic compounds; M. Kesselgruber, M. Lotz, A. Pfaltz, B. Pugin, M. Schoenleber, M. Thommen *PCT Int. Appl.*, WO 2005056566, **2005**, 98 pp.

Iridium-Catalyzed Enantioselective Hydrogenation of Olefins; A. Pfaltz, J. Blankenstein, R. Hilgraf, E. Hoermann, S. McIntyre, F. Menges, M. Schoenleber, S.P. Smidt, B. Wuestenberg, N. Zimmermann *Adv. Synth. Catal.* **2003**, 345, 33.

Chiral Bis(N-arylamino)-phosphine-oxazolines as ligands in Asymmetric Catalysis; M. Schönleber, A. Pfaltz, Herbstversammlung der Schw. Chem. Gesellschaft, Poster, Zürich (Schweiz), **2001**.

New chiral P,N- and P,P-ligands for the Palladium-catalyzed Allylic Alkylation; M. Schönleber, R. Hilgraf, A. Pfaltz, 20^{ième} Colloque Régio, Poster, Sornetan (Schweiz), **2000**.

Meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. A. Pfaltz danke ich für die interessanten Themenstellungen, die grosszügigen Freiheiten bei der Durchführung dieser Arbeit sowie dem entgegengebrachten Vertrauen. Frau Prof. Dr. H. Wennemers danke ich für die freundliche Uebernahme des Korreferates.

Dank geht an Dr. B. Pugin, Dr. M. Lotz und Dr. M. Kesselgruber der Firma *Solvias AG* (Basel) für die sehr gute Zusammenarbeit, für deren stete Diskussionsbereitschaft und substanziellen Unterstützung. Merci für die schöne gemeinsame Zeit und für anregende Gespräche geht an die Belegschaft des Labors 210, an C. Markert und an E. Hörmann. Bedanken möchte ich mich ganz speziell bei meinem Freund Christian Exner, der mit seiner akribischen Korrektur des Manuskriptes und seiner einmaligen Art wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat; danke für die vielen schönen Ausflüge im ganzen Dreiland. Aber auch meinem Bruder Ralph gebührt Dank für die Korrektur der Arbeit. Bedanken möchte ich mich auch bei Dr. S. Pulacchini für die unvergesslichen „Ferrocen-Seminare“. Meinem Diplomanden P. Sommer danke ich für die geleistete Arbeit. Dank geht an alle derzeitigen und ehemaligen Mitglieder des Arbeitskreises, die alle zur freundlichen Atmosphäre beigetragen haben. Dr. K. Kulicke gebührt grosser Dank für die Aufnahme und Diskussion der zweidimensionalen NMR-Spektren. Dr. H. Nadig und W. Kirsch danke ich für die Aufnahmen der Massenspektren bzw. für die Bestimmung der Elementaranalysen. Des Weiteren bedanken möchte ich mich bei Dr. M. Neuburger für die Durchführung der Röntgenstrukturanalysen, sowie S. Kaiser, E. Neumann, B. Bulic und Dr. P. Mukherjee, welche sich um die Verfeinerung kümmerten. Bedanken möchte ich mich aber auch bei M. Mambelli-Johnson für die Abwicklung aller administrativen Belange und auch allen Angestellten des Institutes für Organische Chemie.

Ein herzliches Dankeschön gebührt meiner Mutter, meinem Bruder und Familie wie auch meiner Freundin Sonia für deren Rückhalt und Unterstützung während meiner Studienzeit.

Die vorliegende Arbeit wurde unter Anleitung von Herrn Prof. Dr. A. Pfaltz von Mai 2000 bis April 2005 am Institut für Organische Chemie der Universität Basel durchgeführt. Sie wurde vom *Schweizerischen Nationalfond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung* (SNF), durch die Schweizer Regierung im Rahmen des KTI-Projektes (*Kommission für Technologie und Innovation*) und durch die Uni Basel finanziell unterstützt. Ein Teil der Druckkosten wurde freundlicherweise von der Firma *Solvias AG* übernommen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Allgemeines	3
Asymmetrische Katalyse	3
Literatur	5

2 Synthese neuer P,N-Liganden

Allgemeines	9
Aufgabenstellung	11
Synthesestrategie	12
Synthese von substituierten, chiralen Diaminen	13
Synthese von Oxazolinalkohol 15	16
Synthese von Phosphorchloriditen	16
Synthese von P,N-Liganden	18
Literatur	21

3 Enantioselektive Hydrierungen von prochiralen Olefinen und Iminen

Synthese von Iridium-Komplexen	25
Optimierung der Katalyse-Bedingungen	27
Hydrierung mit variabler Katalysator-Menge bei konstantem Druck	27
Hydrierung mit variablem Druck und 1.0 bzw. 0.50 mol% Katalysator	29
Ergebnisse der Hydrierungen	30
(E)-1,2-Diphenylpropen 40	32
(E)-2-(4-Methoxyphenyl)phenylpropen 45	33
(E)- / (Z)-2-(4-Methoxyphenyl)but-2-en (E)- / (Z)- 47	34
2-(4-Methoxyphenyl)buten 48	36
6-Methoxy-1-methyl-3,4-dihydronaphthalin 46	37
N-(1-Phenylethyliden)anilin 44	38
(E)-2-Methyl-3-phenylprop-2-enol 49 / 3-Methyl-cyclohexenon 50	38
β-Methylzimtsäureethylester 42	39
(E)- / (Z)-3-Methyl-5-phenyl-2-pentensäure-ethylester (E)- / (Z)- 54	40
(E)-3,4,4-Trimethyl-2-pentensäure-ethylester 51	42
(E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propensäure-ethylester 53	43
(E)-2-Methyl-2-propensäure-benzylester 52	44
Itaconsäure-dimethylester 55 / (E)-2-Methyl-fumarsäure-dimethylester	
56 / (Z)-2-Methyl-maleinsäure-dimethylester 57	44
Zusammenfassung und Ausblick	45
Literatur	46

4 **Synthese neuer *P,P*-Liganden und Metall-Komplexe**

<i>Allgemeines</i>	49
Aufgabenstellung	50
<i>Synthesestrategie</i>	51
<i>Synthese von substituierten, chiralen Diaminen</i>	52
<i>Synthese von <i>P,P,P',P'</i>-Tetra(diethylamino)-1,2-diphosphinoethan 89</i>	54
<i>Synthese der <i>P,P</i>-Liganden</i>	55
<i>Herstellung von Metall-Komplexen</i>	58
<i>Ergebnisse der Katalysen</i>	60
Palladium-katalysierte allylische Alkylierung	60
Rhodium-kat. Hydrierung von <i>N</i> -Acetamidozimtsäuremethylester	62
<i>Zusammenfassung und Ausblick</i>	63
<i>Literatur</i>	64

5 **Untersuchungen zur stereoselektiven Lithiierung von Ferrocenen**

<i>Allgemeines</i>	69
<i>Ortho- und Meta-Metallierung von monosubstituierten Ferrocenen</i>	69
Aufgabenstellung	75
<i>Synthesestrategie</i>	76
<i>Synthese von chiralen Aminen bzw. Diaminen</i>	77
<i>Synthese von Chlorphosphinen</i>	80
<i>Synthese von monosubstituierten Ferrocenen</i>	81
<i>Erste Lithiierungsversuche</i>	85
<i>Substitutionsversuche am Ferrocen</i>	87
Lithiierungsversuche mit 2-Ferrocenyl-1,3-dimethyl[1,3,2]diazaphospholidin (170)	87
Lithiierungsversuche mit 2-Ferrocenyl-1,3-dimethyl[1,3,2]diazaphospholidin-Boran (170BH₃)	90
Lithiierungsversuche mit dem borangeschützten Bis-(<i>N</i> -diethylamino)-phosphin-Derivat 168BH₃	94
Lithiierungsversuche mit dem borangeschützten Bis(morpholino)-phosphin-Derivat 171BH₃	97
Lithiierungsversuche mit weiteren, von chiralen Diaminen abgeleiteten Ferrocenylphosphinen	100
Lithiierungsversuche mit dem von <i>N,N',N'</i> -Trimethylethylendiamin abgeleiteten Derivat 175	102
Lithiierungsversuche mit (3 <i>aR</i> ,7 <i>aR</i>)-Octahydro-1,3-bis(2-methoxyethyl)-2-ferrocenyl-1 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>][1,3,2]diazaphosphol-Boran (167BH₃)	105
Lithiierungsversuche mit Methoxymethylpyrrolidin-Derivat 177BH₃	115
Lithiierungsversuche mit weiteren, von chiralen Aminen bzw. Diaminen abgeleiteten Ferrocenylphosphinen mit zusätzlichen Koordinationsstellen	127
Lithiierungsversuche mit den von (-)-Ephedrin abgeleiteten, borangeschützten Derivaten 179BH₃ und 208BH₃	128
<i>Zusammenfassung und Ausblick</i>	130
<i>Literatur</i>	134

6 **NMR-spektroskopische Untersuchungen von lithiierten Ferrocenderivaten**

<i>Allgemeines</i>	141
Aggregate der Organolithium-Verbindungen	141
Aufgabenstellung	143
<i>Lithiierte Intermediate – Stabilitäten und Spektren</i>	143
NMR-Experimente mit (3 <i>aR</i> ,7 <i>aR</i>)-Octahydro-1,3-bis(2-methoxyethyl)-2-ferrocenyl-1 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>][1,3,2]diazaphosphol-Boran (167BH₃)	143
NMR-Experimente mit dem Methoxymethyl-pyrrolidin-Derivat 177BH₃	147
Modellvorstellungen zur stereoselektiven <i>ortho</i> -Lithiierung in 167BH₃ und 177BH₃	160
<i>Zusammenfassung und Ausblick</i>	164
<i>Literatur</i>	166

7 **Zusammenfassung und Abstract**

<i>Zusammenfassung</i>	171
<i>Abstract</i>	173

8 **Experimenteller Teil**

<i>Allgemeine Hinweise</i>	177
Analytische Methoden	179
Arbeitstechniken	
<i>P,N-Liganden und deren Iridium-Komplexe</i>	
Synthese des Oxazolinalkohols 15	180
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der Diamine (AAV 1)	180
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der Phosphorchloridite (AAV 2)	181
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der <i>P,N</i> -Liganden (AAV 3)	182
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der Iridium-Komplexe (AAV 4)	183
<i>Iridium-katalysierte Hydrierungen</i>	
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Hydrierung (AAV 5)	211
Substrate und deren Hydrierprodukte	211
<i>P,P-Liganden und deren Katalysen</i>	
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der sulfonylierten Diamine (AAV 7)	220
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der <i>P,P</i> -Liganden (AAV 8)	221
Synthese von (1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-Bis(methylamino)-1,2-diphenylethan 79	228
Synthese der Metall-Komplexe	230
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur allylischen Alkylierung (AAV 9)	232
Edukte und Produkte der allylischen Alkylierungen	232
<i>Lithiierungsversuche an Ferrocenderivaten</i>	
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der Phosphorchloridite	

(AAV 10)	235
Synthesevorschriften für Ferrocenyllithium 166 (AAV 11)	236
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung der monosubstituierter Ferrocene (AAV 12)	236
Allgemeine Lithierungs-Vorschriften (AAV 13 bis 17)	238
Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung von Dichlorferrocenyl- phosphin 169 (AAV 18)	246
NMR-spektroskopische Untersuchungen	302
Kristallstrukturdaten	307
<i>Literatur</i>	310

Abkürzungsverzeichnis

$[\alpha]_D^{20}$	optischer Rotationswinkel bei 589 nm und 20.0 °C
AAM	Accurate Mass Measurement (= hochaufgelöste MS)
Abb.	Abbildung
abs.	absolut, wasserfrei
AIBN	Azobisisobutyronitril
Ar	Aromat
BAr _F	Tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat
ber.	berechnet
Bez.	Bezeichnung
BINAP	2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
BINOL	1,1'-Bi-2-naphthol
BMS	Boran-Dimethylsulfid-Lösung
BSA	<i>N,O</i> -Bis(trimethylsilyl)acetamid
COD	1,5-Cyclooctadien
Cp	Cyclopentadienyl
d	Tag(e)
δ	chemische Verschiebung [ppm]
dba	Dibenzylidenacetone
DC	Dünnschichtchromatographie
dcpe	Bis(dichlorophosphino)ethan
DCM	Dichlormethan, Methylenchlorid
DEE	Diethylether
dest.	destilliert
DMAP	4-(Dimethylamino)-pyridin
DME	1,2-Dimethoxyethan
DMF	<i>N,N</i> -Dimethylformamid
DMG	Engl. für directed metalation group
DPEDA	1,2-Diphenylethyldiamin
<i>de</i>	Diastereomerenüberschuss [%]
EA	Elementaranalyse
<i>ee</i>	Enantiomerenüberschuss [%]
EE	Essigsäureethylester
EI	Elektronenionisation
EP	Elektronenpaar
eq.	Aequivalent(e)
ESI	Elektrospray-Ionisation
Et	Ethyl
Etg.	Eintrag
FAB	fast atom bombardement (= milde MS-Methode)
Fc	Ferrocen, Ferrocenyl
GC	Gaschromatographie
gef.	gefunden
h	Stunde(n)
hfc	3-(Heptafluoropropyl-hydroxymethyl)-d-camphorat
HMBC	Heteronuclear Multiple Bond Correlation (= ¹ H- ¹³ C-long-range-Korrelations-NMR)
HMQC	Heteronuclear Multiple Quantum Coherence (= zweidimensional korreliertes ¹ H- ¹³ C-NMR)

HPLC	Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
HV	Hochvakuum
Hz	Hertz
<i>i</i>	iso
IR	Infrarotspektroskopie
<i>J</i>	Kopplungskonstante [Hz]
kat.	katalytisch
konz.	konzentriert
LDA	Lithiumdiisopropylamid
<i>t</i> LICKOR	Gemisch aus <i>t</i> BuLi und Kalium- <i>tert</i> -butylat
Lsg.	Lösung
LM	Lösungsmittel
M	Molar(ität)
mc	Zentrum des Multipletts
Me	Methyl
min	Minute(n)
MS	Massenspektrometrie
MV	Membranpumpen-Vakuum (ca. 14 mbar)
<i>m/z</i>	Masse/Ladung
<i>v</i>	Wellenzahl [cm ⁻¹]
Naph	Naphthalin
NBA	<i>meta</i> -Nitrobenzylalkohol, FAB-Matrix
NBD	2,5-Norbornadien
NBS	<i>N</i> -Bromsuccinimid
n.d.	nicht detektiert
neat	Reaktion ohne Lösungsmittel
NMR	magnetische Kernresonanzspektroskopie
NOE(SY)	Nuclear Overhauser Effect (SpectroscopY)
<i>o</i> L	<i>ortho</i> -Lithiierung
Ph	Phenyl
PHOX	Phosphin-Oxazolin
PMDTA	1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylentriamin
PPFA	((Diphenylphosphino)ferrocenyl)ethylamin
<i>R_f</i>	Retentionsfaktor (DC)
ROE(SY)	Rotating frame Overhauser Enhancement (SpectroscopY)
RT	Raumtemperatur (20 °C)
RV	Rotationsverdampfer
<i>s</i>	<i>sec</i>
sat.	saturated, gesättigt
Sdp.	Siedepunkt [°C]
SL	<i>Schlösser-Lochmann</i> -Bedingungen
Smp.	Schmelzpunkt [°C]
<i>t</i>	<i>tert</i>
Tab.	Tabelle
TBME	<i>tert</i> -Butylmethylether
TEA	Triethylamin
THF	Tetrahydrofuran
TMEDA	<i>N,N,N',N'</i> -Tetramethylethyldiamin
TMSCl	Trimethylsilylchlorid
TOC(SY)	TOTal Correlation SpectroscopY

Tol	Tolyl
t_R	Retentionszeit [min] (GC, HPLC)
UV ₂₅₄	DC-Detektion mit Ultraviolett-Licht bei 254 nm
ü.N.	über Nacht
Vbg.	Verbindung(en)

Allgemeines

Um chirale Moleküle *enantiomerenrein* synthetisieren zu können, gibt es im Wesentlichen vier Vorgehensweisen:

- 1) Durch *Racematspaltung* werden die Enantiomere mittels Kristallisations- und / oder chromatographischen Techniken getrennt.
- 2) Ausgehend von enantiomerenreinen Naturstoffen (wie Terpenen, Kohlenhydraten oder Aminosäuren) aus dem *chiral pool* können die Endprodukte erhalten werden.
- 3) Unter Verwendung von *Biokatalysatoren* (Enzymen, Zellkulturen oder ganzen Mikroorganismen) lassen sich bestimmte Transformationen effizient durchführen.
- 4) Die *asymmetrische Synthese* ermöglicht durch den Transfer der chiralen Information vom verwendeten, chiralen Auxiliar (Reagenz oder Katalysator) auf das entstehende Produkt die Herstellung des gewünschten Enantiomers.

Die wichtigsten Methoden stellen die beiden letztgenannten dar, wobei die speziellen „Arbeits“-Bedingungen der Biokatalysatoren deren Einsatzgebiete einschränken. Eines der häufig angewendeten Verfahren der asymmetrischen Synthese ist die unten näher beschriebene *asymmetrische Katalyse*.

Asymmetrische Katalyse^{1a, 1b}

1966 publizierte *Wilkinson et al.*² die *homogene* Hydrierung von Alkenen mit $(\text{Ph}_3\text{P})_3\text{RhCl}$ als Katalysator-Vorläufer. Der Mechanismus dieser katalytischen Reaktion wurde intensiv untersucht, und es konnte gezeigt werden, dass während des gesamten Katalysezyklus immer zwei Phosphin-Liganden am Rhodium koordiniert bleiben. Die ersten chiralen Varianten des Wilkinson-Katalysators wurden von *Horner*³ und *Knowles*⁴ entwickelt, indem sie das Triphenylphosphin durch chirale Phosphine austauschten (s. **Schema 1.1**). Sie erhielten damit in der Hydrierung des DOPA-Vorläufers bis zu 15% *ee*. In den darauf folgenden Jahren wurden viele *monodentate* Phosphin-Liganden synthetisiert und getestet.

Obwohl bis heute schon für viele metall-katalysierte Reaktionen effiziente Liganden existieren, dauert die Suche nach neuen, noch aktiveren und sterisch- sowie elektronisch-angepassteren Katalysatoren noch an.

Literatur

- (1) (a) Tsukazaki, M.; Tinkl, M.; Roglans, A.; Chapell, B. J.; Taylor, N. J.; Snieckus, V. *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, *118*, 685; (b) Knowles, W. S.; Noyori, R.; Sharpless, K. B., Information for the Public - The 2001 Nobel Prize in Chemistry. *Nobel e-Museum* unter www.nobel.se **2001**.
- (2) Osborn, J. A.; Jardine, F. S.; Young, J. F.; Wilkinson, G. *J. Chem. Soc., Abstracts* **1966**, 11711.
- (3) Horner, L.; Siegel, H.; Büthe, H. *Angew. Chem. Int. Ed.* **1968**, *7*, 942.
- (4) Knowles, W. S.; Sabacky, M. J. *J. Chem. Soc. Chem. Commun.* **1968**, 1445.
- (5) Knowles, W. S. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, *41*, 1998.
- (6) Knowles, W. S.; Sabacky, M. J.; Vineyard, B. D.; Weinkauff, D. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1975**, *97*, 2567.
- (7) Spindler, F.; Blaser, H.-U. *Adv. Synth. Catal.* **2001**, *343*, 68.
- (8) Knowles, W. S. *Angew. Chem.* **2002**, *114*, 2096.
- (9) (a) Noyori, R. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, *41*, 2009; (b) Noyori, R. *Angew. Chem.* **2002**, *114*, 2108.
- (10) (a) Sharpless, K. B. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, *41*, 2025; (b) Sharpless, K. B. *Angew. Chem.* **2002**, *114*, 2126.

Synthese neuer P,N-Liganden

Allgemeines

Die ersten Iridium-katalysierten Hydrierungen wurden Ende der 70er Jahre durch *Crabtree und Mitarbeiter*^{1a, 1b, 1c} beschrieben. Es konnte gezeigt werden, dass $[\text{Ir}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ zusammen mit Pyridin, Tricyclohexylphosphin und NH_4PF_6 in Dichlormethan einen sehr robusten Katalysator ergab, welcher tri- und tetrasubstituierte, unfunktionalisierte Alkene mit hohen Ausbeuten auch bei niedrigen Temperaturen hydrierte (s. **Abbildung 2.1**).

Abbildung 2.1. *Crabtree-Katalysator und dessen Anwendung.* Cy = Cyclohexyl, COD = 1,5-Cyclooctadien.

Durch die Weiterentwicklung des *Crabtree*-Katalysators gelangte man über die Verknüpfung der Phosphor- und der Stickstoff-Einheiten in der Gruppe *Pfaltz* zu Phosphinoxazolin (PHOX)-Liganden (s. **Abbildung 2.2**).

Abbildung 2.2. *Verknüpfung der Phosphor- und der Stickstoff-Einheiten zu PHOX-Liganden.*

Diese PHOX-Liganden zeigten in den Hydrierungen von Iminen^{2a, 2b, 2c} und von unfunktionalierten C=C-Doppelbindungen^{3a, 3b} sehr gute Stereoselektivitäten. Weitere Fortschritte konnten durch den Austausch des PF_6^- -Anions gegen das schwach koordinierende BAR_F^- -Anion⁴ erzielt werden und die Variation der Strukturen um das Phosphor- sowie das Stickstoffatom führte zu neuen Ligandstrukturen (s. **Abbildung 2.3**).

Abbildung 2.3. Variationen der PHOX-Struktur zu neuen *P,N*-Liganden.

Mit diesen neuen Ligandstrukturen **A** bis **G** konnten nicht nur in Iridium-katalysierten Hydrierungen von Alkenen^{5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 5b} hohe Stereoselektivitäten sowie Umsätze erhalten werden. Das Anwendungsgebiet dieser Liganden konnte auch um Transfer-Hydrierungen von Ketonen⁷, Palladium-katalysierte allylische Alkylierungen^{5a, 5b} sowie um Kupfer-katalysierte Additionen von Dialkylzink an Enone⁸ erfolgreich erweitert werden.

Aufgabenstellung:

Das Ziel dieses und des folgenden **Kapitels 2** bzw. **3** war es, in Ligandtyp **C'** durch Austausch der Sulfoxidreste mit Aryl- oder Alkylgruppen sowie durch Verwendung von weiteren, chiralen Diaminen die strukturellen und elektronischen Eigenschaften dieser Liganden zu variieren (s. **Abbildung 2.4**).

Abbildung 2.4. Modularer Aufbau der *P,N*-Liganden. Ar = Aryl-Modul, $N\cap N^*$ = chirales Diamin-Modul.

Anhand von Hydrierungen unterschiedlicher Alkene sollten die Auswirkungen der neuen *P,N*-Liganden auf die Aktivität des Iridium-Katalysators bzw. die Substraterkennung und der daraus resultierenden Stereoselektivität der Katalyse gezeigt werden.

Synthesestrategie

Die Synthesestrategie zur Darstellung der neuen *P,N*-Liganden entspricht im Wesentlichen dem von *Hilgraf*^{9, 5a, 5b} beschriebenen Weg. Dabei werden chirale Diamine in einem ersten Schritt aryliert oder alkyliert und anschliessend mit Phosphortrichlorid zu den entsprechenden Phosphorchloriditen umgesetzt. Diese wiederum werden durch Reaktion mit einem Oxazolinalkohol in die Liganden umgewandelt (s. **Abbildung 2.5**).

Abbildung 2.5. Synthesestrategie *P,N*-Liganden.

Synthese von substituierten, chiralen Diaminen

Diese *P,N*-Liganden sind wie in **Abbildung 2.4** dargestellt nach einem modularen Prinzip aufgebaut, wobei jedes dieser Module einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Umgebung des später zugesetzten, katalysierenden Metalls ausüben kann. So haben z.B. die Reste R der Ethylenbrücke aufgrund ihrer Entfernung zu denen ans Metall koordinierenden Stellen nur indirekte, die Aryl- bzw. Alkyl-Seitenketten auf der anderen Seite direkte sowohl sterische als auch elektronische Auswirkungen auf die zu katalysierende Reaktion. Deshalb sollten durch Variation des chiralen Grundgerüsts wie auch durch Verwendung verschiedener Substituenten an den Stickstoffatomen deren Folgen auf den Ausgang der Hydrierungen untersucht werden.

Dazu ging man vom (*1R,2R*)-Cyclohexan-1,2-diamin **1** oder vom (*1R,2R*)-Diphenylethyldiamin **2** aus, und setzte diese mittels *Buchwald-Hartwig* Aminierung^{10a, 10b} in die entsprechenden substituierten, chiralen Diamine um (s. **Schema 2.1**). Hierzu wurde Pd₂(dba)₃ mit *rac*-BINAP in Toluol für eine Stunde vorkomplexiert, das Arylbromid sowie NaOtBu zugegeben und das chirale Diamin beigemischt. Nach Erhitzen für mehrere Stunden auf 80 bis 110 °C und anschließender chromatographischer Reinigung sowie Umkristallisation wurden die gewünschten Produkte in Ausbeuten zwischen 31 und 99% (bzgl. Bromid) isoliert. Weitere Bromide, wie 4-Brom-*N,N*-dimethylanilin und 1-Brom-3,4-methylenedioxy-benzol wurden eingesetzt, doch daraus keine substituierten Amine erhalten.

Schema 2.1. Synthese chiraler Diamine.

Ueber eine alternative Syntheseroute wurde das Arylmethyl-substituierte Diamin **3** hergestellt. Hierzu wurde zunächst 1-Methylnaphthalin **4** nach *Futamura et al.*¹¹ in einer

radikalischen Kettenreaktion mit NBS in Benzol zu 95% zum bromierten Produkt **5** umgesetzt (s. **Schema 2.2**).

Schema 2.2. Synthese von 1-(Bromomethyl)naphthalin **5**.

Anschliessend konnte durch zweifache Substitution mit Natrium-*tert*-butylat als Base nach zweistündigem Erhitzen das gewünschte Diamin **3** in 43%iger Ausbeute (bzgl. Bromid) erhalten werden. Die Seitenarme dieses Diamins bringen nicht nur Flexibilität (hervorgerufen durch die CH₂-Gruppe zwischen Naphthalin und Amin), sondern durch die Ausdehnung der Aryl-Reste auch sterische Hinderung in das Ligandengerüst ein (s. **Schema 2.3**).

Schema 2.3. Synthese von **3** und deren sterische Gegebenheiten.

Eine Uebersicht der über diese beiden Synthesewege erhaltenen Diamine ist in **Abbildung 2.6** dargestellt.

Abbildung 2.6. Uebersicht dargestellter chiraler Diamine. In Klammern sind die Ausbeuten notiert. ^{a)} via S_N2-Substitution erhalten.

Synthese von Oxazolinalkohol **15**

Der Oxazolinalkohol **15** wurde nach der Vorschrift von *Allen et al.*¹² aus α -Hydroxyisobuttersäure **16** und *tert*-Leucinol **17** unter Wasserabscheidung in Xylol über Nacht hergestellt und konnte nach chromatographischer Reinigung und Umkristallisation als farbloser Feststoff mit 62%iger Ausbeute erhalten werden (s. **Schema 2.4**).

Schema 2.4. Synthese von Oxazolinalkohol **15**.

Synthese von Phosphorchloriditen

Die Umsetzung der substituierten, chiralen Diamine zu ihren Phosphorchloriditen erfolgte durch langsames Erwärmen der Reaktionslösungen, bestehend aus chiralem, disubstituiertem Diamin, Phosphortrichlorid sowie Triethylamin in Toluol (s. **Schema 2.5**). Da die erhaltenen Chloridite aufgrund ihres Substitutionsmusters am Phosphoratom sehr luft- und wasserempfindlich sind, wurden zu ihrem Nachweis nur NMR-spektroskopische Untersuchungen nach Filtration unter Argon durchgeführt und die (P-Cl)-Intermediate anschliessend ohne weitere Reinigung zu den Liganden umgesetzt (s. nächstes Unterkapitel).

Schema 2.5. Synthese der Phosphorchloridite.

Die chemischen Verschiebungen aus den ^{31}P -NMR-Spektren sind in folgender **Tabelle 2.1** aufgelistet.

Tabelle 2.1. ^{31}P -NMR-Verschiebungen der Phosphorchloridite **18** bis **24**[§]

Bez.	R, R	Ar	^{31}P [ppm]
18	Ph, Ph	3-CH ₃ O-C ₆ H ₄	146.4
19	Ph, Ph	4-CH ₃ O-C ₆ H ₄	146.2
20	Ph, Ph	4-Ph-C ₆ H ₄	146.1
21	Ph, Ph	4- <i>t</i> Bu-C ₆ H ₄	148.1
22	Ph, Ph	2-Naphthyl	146.3
23	Ph, Ph	1-Naphthylmethyl	167.6
24	-(CH ₂) ₄ -	4-CH ₃ -C ₆ H ₄	151.9 [§]

[§]) NMR-Messung in d_7 -CDCl₃ und bei 162 MHz.

[§]) NMR-Messung in d_6 -C₆D₆ und bei 162 MHz.

Hierbei zeigten die chemischen Verschiebungen die unterschiedlichen elektronischen Einflüsse der Substituenten auf. Während die Arylseitenketten der Stickstoffatome nur einen geringen Einfluss auf die chemischen Verschiebungen der ^{31}P -NMR-Signale hatten (**18** bis **22**), führte der Naphthylalkyl-Substituent in **23** zu einer deutlichen Tieffeld-Verschiebung.

Aus dem *ortho*-Methoxy-substituierten Diamin **6**, sowie **12** mit 1-Naphthalin als Substituenten konnten die Heterozyklen im Gegensatz zum BINOL-analogen Diamin **9** NMR-spektroskopisch nachgewiesen werden, wenn auch z.T. mit Auftreten von Isomeren. Jedoch scheiterte die Isolierung der Liganden.