Hans-Klaus Dreier

Klinik der Reproduktionsmedizin des Hundes

v
e
t

schlütersche

v
e
t

Aus der Praxis und für die Praxis bietet dieses Buch zur Reproduktionsmedizin eine umfassende Übersicht über alle relevanten Aspekte der Gynäkologie und Andrologie beim Hund.

Die systematische Umsetzung der wichtigen Untersuchungsgänge zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch: zahlreiche Bildfolgen stellen diagnostische Techniken sowie Untersuchungsbefunde anschaulich dar und die konsequente Aufarbeitung der klinischen Probleme über klare Algorithmen begleitet den Weg der Diagnosefindung.

Im Fokus stehen die Betreuung der Zuchthündin und des Rüden. Dazu zählen die Beurteilung des Zyklus einschließlich Festlegung des Deckzeitpunktes, Deckverhalten, künstliche Besamung, Trächtigkeit, Geburt und die Versorgung der Welpen in der Nachgeburtsperiode gleichermaßen wie Genitalinfektionen oder Fruchtbarkeits- und Geburtsstörungen. Ausführlich werden Erkrankungen des Genitaltraktes sowie gynäkologische und andrologische Operationen dargestellt.

Eine DVD mit umfangreichem Bildmaterial zur vaginalendoskopischen Untersuchung und mehr als 650 Abbildungen im Buch geben praktizierenden Tierärzten die Möglichkeit, Untersuchungsgänge und Operationen schrittweise nachzuvollziehen sowie eigene klinische oder labordiagnostische Befunde mit dem gegebenen Bildfundus abzugleichen.

v
e
t

ISBN 978-3-89993-061-0

9 783899 930610

v
e
t

S

HANS-KLAUS DREIER

Klinik der Reproduktionsmedizin des Hundes

HANS-KLAUS DREIER

Klinik der Reproduktionsmedizin des Hundes

Unter Mitarbeit von

GILLES DUPRÉ, VALENTINA FIORBIANCO,
ELISABETH MAYRHOFER, BARBARA NELL, SABINE SCHÄFER-SOMI

schlütersche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de/> abrufbar.

ISBN 978-3-89993-061-0

© 2010, Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hans-Böckler-Allee 7,
30173 Hannover

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.

Eine Markenbezeichnung kann warenzeichenrechtlich geschützt sein, ohne dass diese gesondert gekennzeichnet wurde. Die beschriebenen Eigenschaften und Wirkungsweisen der genannten pharmakologischen Präparate basieren auf den Erfahrungen der Autoren, die größte Sorgfalt darauf verwendet haben, dass alle therapeutischen Angaben dem derzeitigen Wissens- und Forschungsstand entsprechen. Darüber hinaus sind die den Produkten beigefügten Informationen in jedem Fall zu beachten. Der Verlag und die Autoren übernehmen keine Haftung für Produkteigenschaften, Lieferhindernisse, fehlerhafte Anwendung oder bei eventuell auftretenden Unfällen und Schadensfällen. Jeder Benutzer ist zur sorgfältigen Prüfung der durchzuführenden Medikation verpflichtet. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr.

Satz: Dörlemann Satz, Lemförde

Druck und Bindung: Werbedruck Aug. Lönneker GmbH & Co. KG, Stadtoldendorf

Inhalt

Autoren	XI	5.9	Proöstrus / Östrus	50
Vorwort	XIII	5.10	Östrus	52
1	Embryologie der Geschlechtsorgane	5.11	Unterschiedlich großes Labial- ödem	54
	1	5.12	Östrus / Metöstrus	55
2	Anatomie der Geschlechtsorgane	5.13	Metöstrus sehr früh (1. Woche)	56
		5.14	Metöstrus	57
2.1	Weibliche Geschlechtsorgane	5.15	Metöstrus spät	58
2.2	Männliche Geschlechtsorgane	5.16	Deckzeitpunktbestimmung	59
	3	5.17	Zyklisch bedingte Veränderungen der Uterusmukosa	61
	6			
3	Deckverhalten	6	Ursachen für Fruchtbarkeitsstörungen während der Läufigkeit	
	9			
4	Gynäkologie (Therigenologie)	6.1	Allgemeinerkrankungen	63
		6.2	Abnormes Deckverhalten der Zuchthündin	63
4.1	Physiologie			
	11	6.2.1	Falscher Deckzeitpunkt	64
4.1.1	Geschlechtsreife (Pubertät)	6.2.2	Unerfahrenheit	64
	11	6.2.3	Anaphrodisie	64
4.1.2	Normozyklus	6.2.4	Nymphomanie	64
	11	6.2.5	Antipathie	64
4.1.3	Zuchtreife	6.2.6	Aggressivität	64
	11	6.2.7	Tier-Mensch-Beziehung	64
4.1.4	»Wechsel« bei der Hündin	6.3	Deckverletzungen	64
	11			
4.1.5	Hormonelle Steuerung des Sexual- zyklus	6.3.1	Kranialer Scheidenbereich	65
	12	6.3.1.1	Erkennbare Perforationsstelle	65
4.2	Klinisch-gynäkologische Untersuchung	6.3.1.2	Vorfall von Bauchorganen in die Vagina	65
	16			
4.2.1	Erforderliche Ausrüstung	6.3.1.3	Ruptur der Harnblase, Hämatome	66
	16	6.3.2	Hymenal- und kaudaler Scheidenbereich	66
4.2.2	Anamnese			
	17	6.3.3	Vestibulum mit Perforation der Klitoris	66
4.2.3	Untersuchungsgang	6.4	Zyklusstörungen der Zucht- hündin	67
	17			
4.2.3.1	Allgemeine Untersuchung	6.4.1	Abweichungen vom Normozyklus	67
	17			
4.2.3.2	Adspektion	6.4.1.1	Verlängerter Proöstrus und physiologischer Östrus	67
	17			
4.2.3.3	Beurteilung des Scheidenausflusses	6.4.1.2	Physiologischer Proöstrus und kurzer/ langer Östrus	67
	23	6.4.1.3	Stille Läufigkeit	67
4.2.3.4	Genitalreiz	6.4.2	Pathozyklus	67
	25			
4.2.3.5	Inspektion des Vestibulums	6.4.2.1	Geteilte erste Läufigkeit bei der Junghündin	67
	25			
4.2.3.6	Inspektion von Vagina und Zervix	6.4.2.2	Anöstrie	68
	26	6.4.2.3	Anovulatorischer Zyklus	69
4.2.3.7	Vaginalzytologie	6.4.2.4	Suböstrie	70
	31			
4.2.3.8	Palpation von Uterus und Gesäuge	6.5	Normozyklus und Hyper- östrinämie	71
	37			
4.2.3.9	Blutuntersuchung			
	39			
4.2.3.10	Bildgebende Verfahren			
	41			
5	Klinik des Sexualzyklus bei der Zuchthündin			
5.1	Voraussetzungen für Zuchttiere			43
5.2	Züchterischer Stafettenlauf			43
5.3	Anöstrus			43
5.4	Anöstrus / Proöstrus			43
5.5	Proöstrus sehr früh			45
5.6	Proöstrus früh			46
5.7	Proöstrus			48
5.8	Proöstrus spät			49

VI Inhalt

6.6	Normozyklus und subklinische Genitalinfektion	71	9.5	Physiologische Geburt	96
6.6.1	Bakterielle Genitalinfektionen	71	9.5.1	Eröffnungsphase	96
6.6.2	<i>Mycoplasma-canis</i> -Infektion	74	9.5.2	Aufweitungsphase	96
6.6.3	Canine Herpesvirusinfektion	74	9.5.3	Austreibungsphase	96
7	Klinik der physiologischen Trächtigkeit ■		9.6	Abnabelung	98
7.1	Hormonelle Situation	75	10	Klinik der pathologischen Geburt ■	
7.1.1	Progesteron	75	10.1	Hinweise für eine abgestorbene Frucht	99
7.1.2	Östrogen	76	10.2	Häufigkeit der Geburtshilfe	99
7.1.3	Prolaktin	76	10.3	Geburtsstörungen	99
7.1.4	Relaxin	76	10.3.1	Primäre Wehenschwäche	100
7.2	Trächtigkeitsdauer	77	10.3.2	Sekundäre Wehenschwäche	100
7.3	Physiologische Trächtigkeit	78	10.3.3	Keine / mangelhafte Eröffnung des Muttermundes	100
7.4	Trächtigkeitsdiagnose	78	10.3.4	Sehr enges Vestibulum	100
7.4.1	Adspektion	78	10.3.5	Trockener Geburtskanal	101
7.4.2	Vaginale Inspektion	80	10.3.6	Beckenenge	101
7.4.3	Abdominale Palpation	80	10.3.7	Einhorngravidität	101
7.4.4	Sonografie	80	10.3.8	Einfürchtigkeit / absolut zu große Frucht	101
7.4.5	Röntgen	82	10.3.9	Fruchtüberladung	102
7.4.6	Semiquantitative Bestimmung von Relaxin im Serum	82	10.3.10	Eintreten von zwei Welpen in den Geburtsweg	102
8	Klinik der pathologischen Trächtigkeit – Ursachen für Fruchtbarkeitsstörungen ■		10.3.11	Fehlerhafte Lage, Haltung und Missbildung der Frucht	102
8.1	Hyperöstrinämie <i>post copulationem</i>	83	10.3.12	Uterusruptur	102
8.2	Hypoluteinismus	85	10.3.13	Emphysematöse Frucht	104
8.3	Fruchtresorption	86	10.3.14	Torsio uteri	104
8.4	Abortus	87	10.3.15	Eklympsie	106
8.4.1	<i>Brucella-canis</i> -Infektion	88	10.4	Behandlung von Geburtsstörungen	106
8.4.2	Canine Herpesvirusinfektion	88	10.4.1	Geburtshilfe mit Wehenmittel	107
8.5	Mazeration von Feten	88	10.4.2	Manuelle Geburtshilfe	107
8.6	Mumifikation von Feten	88	10.4.3	Geburtshilfe mit einer Geburtszange	108
8.7	Blutung während der Trächtigkeit	89	10.4.4	Fetulzie (Fruchtzerstückelung)	110
8.8	Überladung	89	10.4.5	Dammschnitt (Episiotomie)	110
8.9	Extrauterin gravidität	89	10.4.6	Kaiserschnitt	110
8.10	Trächtigkeit und Hernia inguinalis	90	10.4.6.1	Sectio caesarea conservativa	110
9	Klinik der physiologischen Geburt ■		10.4.6.2	Sectio Porro	115
9.1	Hormonelle Situation	91	10.4.6.3	Uterusteilresektion	115
9.1.1	Vorbereitungsphase	91	10.5	Nachgeburtsverhalten	116
9.1.2	Öffnungsphase	91	10.6	Gebärmuttervorfall	120
9.1.3	Austreibungsphase	92	10.6.1	Konservative Behandlung	120
9.2	Klinische Anzeichen einer bevorstehenden Geburt	93	10.6.2	Chirurgische Methoden	120
9.3	Möglichkeiten der Geburtskontrolle	93	10.6.2.1	Laparotomie	120
9.3.1	Beurteilung des Trächtigkeitsschleims	93	10.6.2.2	Zweiphasenoperation	120
9.3.2	Beurteilung der inneren Körpertemperatur	94	11	Neonaten ■	
9.4	Geburtsinduktion	95	11.1	Physiologische Bemerkungen	121
9.4.1	Antiprogesteron und Oxytocin	95	11.2	Geschlechtsdifferenzierung	122
9.4.2	Antiprogesteron und Prostaglandin	95	11.3	Krankheiten	122
			11.3.1	Fruchtwasseraspiration	122
			11.3.2	Peripartale Asphyxie	122
			11.3.3	Icterus neonatorum	123
			11.3.4	Bakterielle Infektionen	123
			11.3.5	Aspirationspneumonie	124

11.3.6	Virale Erkrankung	124	14	Laktation und Mamma	
11.3.6.1	Canines Herpesvirus 1	124	14.1	Physiologie der Laktation	153
11.3.6.2	Canine Minute Virus	124	14.2	Hormonelle Situation der Laktation	153
11.3.7	Parasitäre Infektionen	124	14.3	Mammogenese	154
11.3.8	Missbildungen	125	14.4	Laktogenese	154
11.3.8.1	Lippenspalte	125	14.5	Milchejektion	154
11.3.8.2	Gaumenspalte	125	14.6	Lactatio post partum	154
11.3.8.3	Schwanzmissbildungen	125	14.7	Lactatio sine graviditate	154
11.3.8.4	Bauchspalte	126	14.8	Laktation und Gynäkopathie	154
11.3.8.5	Persistierender Urachus	126	14.9	Laktation nach Ovariohyster- ektomie oder Kastration	155
11.3.8.6	Spina bifida, offene Fontanelle	126	14.10	Laktationsstörungen	155
11.3.8.7	Anasarca	127	14.10.1	Agalaktie	155
11.3.8.8	Atresia ani	127	14.10.2	Hypogalaktie	155
11.3.8.9	Duplicitas completa	128	14.10.3	Verzögerter Laktationseinsatz	155
11.3.8.10	Offene Lidspalte, beidseitiger Exophthalmus	128	14.10.4	Galaktostase	156
11.3.8.11	Juvenile renale Dysplasie	128	14.10.5	Mastitis, Abszess und Nekrose	157
11.3.8.12	Hiatushernie (Hernia diaphragmatica oesophagi)	128	14.11	Mammatumoren	160
11.3.8.13	Offenes Vestibulum	129	15	Gynäkopathien	
11.3.9	Kongenitale Anomalien des Auges und der Adnexe	130	15.1	Erkrankungen des Ovars	165
11.3.9.1	Orbita	130	15.1.1	Abweichungen vom Normozyklus	165
11.3.9.2	Augapfel	130	15.1.2	Normozyklus und Hyperöstrinämie	166
11.3.9.3	Lid	131	15.1.3	Verlängerte Läufigkeit	166
11.3.9.4	Bindehaut	132	15.1.4	Ovarialtumoren	168
11.3.9.5	Tränenapparat	132	15.1.4.1	Granulosazelltumor	168
11.3.9.6	Hornhaut	134	15.1.4.2	Papilläre Adenome und Adenokarzinome	168
11.3.9.7	Sklera	136	15.1.4.3	Zystadenome	168
11.3.9.8	Iris, Ziliarkörper	136	15.1.4.4	Undifferenzierte Karzinome	168
11.3.9.9	Linse	139	15.1.4.5	Teratom	168
11.3.9.10	Glaskörper	141	15.1.4.6	Dysgerminom	168
11.3.9.11	Funduserkrankungen	141	15.1.4.7	Hämangiom	168
11.3.10	Infektionsbedingte Augenerkrankungen	144	15.1.5	Akzessorische Ovarien	169
11.3.10.1	Ophthalmia neonatorum	144	15.1.6	Restovar	170
11.3.10.2	Parvovirus- oder Herpesvirusinfektionen	144	15.2	Erkrankungen des Uterus	170
11.3.11	Mutterlose Aufzucht	144	15.2.1	Hyperplasia glandularis cystica endometrii	170
12	Klinik des physiologischen Puerperiums		15.2.2	Hydrometra	170
12.1	Lochien	145	15.2.3	Mukometra	170
12.2	Vagina, Zervix, Zervikalkanal	146	15.2.4	Endometritis	172
12.3	Involutionsvorgänge am Uterus	146	15.2.4.1	Endometritis purulenta acuta (EPA)	172
12.4	Gesäuge (Mamma)	146	15.2.4.2	Endometritis purulenta chronica (EPC)	172
			15.2.4.3	Segmentale Endometritis/Metritis	172
			15.2.4.4	Akute / perakute nekrotisierende Endometritis und Metritis	174
13	Klinik des pathologischen Puerperiums		15.2.5	Pyometra	176
13.1	Atonia uteri post partum	147	15.2.5.1	Jugendpyometra	176
13.2	Lochialstauung (Lochiometra)	148	15.2.5.2	Typische Pyometra	177
13.3	Postpartale Metrorrhagie	149	15.2.5.3	Involutionspyometra	178
13.4	Puerperale Intoxikation / Infektion	150	15.2.5.4	Pyometra und Hernia inguinalis	179
13.5	Plazentarnekrose	150	15.2.5.5	Pyometra und segmentale Uterusaplasie, Eiterpertubation	180
13.6	Subinvolution der Plazentationsstellen	151	15.2.5.6	Pyometra und Uterustumor	182
13.7	Laktationsstörungen	151	15.2.5.7	Pyometra und Zwitter	182
13.8	Eklampsie	151

VIII Inhalt

15.2.5.8	Stumpfyometra	182	16.1.3	Operationszeitpunkt	197
15.2.6	Uterustumoren	183	16.1.4	Operationsmethoden	200
15.2.6.1	Leiomyom, Leiomyosarkom	183	16.1.4.1	Laparotomie	200
15.2.6.2	Adenokarzinom	183	16.1.4.2	Vorteile der Ovariohysterektomie bzw. Kastration	205
15.2.6.3	Adenomyosis uteri	183	16.1.5	Komplikationen nach einer sachgemäß durchgeführten Ovariohysterektomie	205
15.3	Erkrankungen der Vagina	184	16.1.5.1	Laktation	205
15.3.1	Juvenile Vaginitis	184	16.1.5.2	Nahtdehiszenz	205
15.3.2	Vaginitis	185	16.1.5.3	Harninkontinenz (Incontinentia urinae)	205
15.3.3	Deckverletzungen	185	16.1.5.4	Haut- und Haarkleidveränderungen	208
15.3.4	Scheidenvorfall (Läufigkeitsprolaps)	185	16.1.5.5	Stumpfyometra	208
15.3.4.1	Inkompletter Vaginalprolaps	185	16.1.5.6	Hypoplasie der Vulva, vermehrte Fett- einlagerung im Perineum und peri- vaginale Entzündungsreaktionen	208
15.3.4.2	Kompletter Vaginalprolaps	185	16.1.6	Folgen einer unsachgemäß durchgeführten Ovariohysterektomie	208
15.3.4.3	Vaginalprolaps und Automutilation	185	16.1.6.1	Wieder eintretende Läufigkeit	208
15.3.5	Scheidenpolypen	186	16.1.6.2	Abbinden eines oder beider Ureteren	209
15.3.6	Vaginaltumoren	186	16.2	Laparoskopische Kastrations- techniken in der Kleintierpraxis	210
15.3.7	Perivaginaltumoren	188	16.2.1	Ausstattung	212
15.3.8	Fremdkörper	188	16.2.2	Spezielles Instrumentarium	212
15.3.9	Persistierendes Hymen	188	16.2.2.1	Blut- und Gewebekoagulationssysteme	213
15.3.10	Scheidenspange	188	16.2.2.2	Anästhesieausrüstung	213
15.3.11	Urovagina	188	16.2.3	Patient	214
15.3.12	Sadismus	188	16.2.4	Zugang zur Bauchhöhle	214
15.4	Erkrankungen des Vestibulums	188	16.2.5	Techniken beim weiblichen Tier	216
15.4.1	Vestibulitis	188	16.2.5.1	Laparoskopische Ovariectomie	216
15.4.2	Verletzungen	188	16.2.5.2	Laparoskopische Ovariohysterektomie und laparoskopisch assistierte Ovario- hysterektomie	216
15.4.3	Klitorishypertrophie	189	16.2.6	Komplikationen	216
15.4.4	Offenes Vestibulum	189	16.2.7	Schlussfolgerung	217
15.5	Erkrankungen der Labien und deren Umgebung	189	16.3	Sterilisation der Hündin	218
15.5.1	Abnorme Vulvadeckelung, perilabiale Entzündungsreaktionen, Nekrosen	189	16.4	Einseitige Ovariectomie	219
15.5.2	Verletzungen, Zusammenhangstrennungen	189	16.5	Operation einer Stumpfyometra	219
15.5.3	Labial- und Perilabialtumoren, Atherome	190	16.6	Operation eines Restovars	220
15.5.4	Vorhoffistel	190	16.7	Operation einer Mesovarialfistel und/oder eines Granuloms	220
15.6	Hernien	190	16.8	Scheidenoperationen	221
15.6.1	Hernia inguinalis	190	16.8.1	Episiotomie (Raum schaffende Operation)	222
15.6.2	Hernia diaphragmatica	190	16.8.2	Läufigkeitsprolaps	224
15.6.3	Bauchwandhernie	190	16.8.2.1	Unvollständiger (dreilappiger) Läufigkeits- prolaps	224
15.7	Missbildungen	192	16.8.2.2	Vollständiger Läufigkeitsprolaps	227
15.7.1	Zwitter	192	16.8.3	Entfernung eines persistierenden Hymens	230
15.7.2	Aplasie und Hypoplasie des Ovars	194	16.8.4	Entfernung von Scheidenspangen	230
15.7.3	Akzessorische Ovarien	194	16.8.5	Entfernung von Vaginaltumoren	232
15.7.4	Uterus unicornis, Uteruskörperaplasie, doppelt angelegte Zervix und Vagina	195	16.8.5.1	Gestielter Vaginalpolyp	232
15.7.5	Segmentale Aplasie des Uterus	195	16.8.5.2	Breit aufsitzender Vaginaltumor	233
15.7.6	Scheidenspange	195	16.8.5.3	Perivaginaltumor	235
15.7.7	Persistierendes Hymen	195	16.8.5.4	Klitoris	236
15.7.8	Klitorishypertrophie	195	16.8.6	Urovagina	236
15.7.9	Aplasie der Labien	195	16.8.7	Vulva	236
15.7.10	Hypoplasie der Labien	196			
15.8	Iatrogene Flankenfistel nach Ovariohysterektomie	196			
16	Gynäkologische Operationen				
16.1	Ovariohysterektomie	197			
16.1.1	Indikationen	197			
16.1.2	Allgemeine Bemerkungen	197

16.8.8	Damm	237	17.1.8	Feinnadelaspiration oder Biopsie	250
16.8.8.1	Episioplastie	237	17.1.9	Sonografie und Röntgen	251
16.8.8.2	Tumoren im Damm	239	17.1.9.1	Sonografische Untersuchung	251
16.8.8.3	Vorhoffistel	239	17.1.9.2	Röntgenologische Untersuchung	251
16.8.9	Deckverletzungen	239	17.2	Instrumentelle Samenübertragung	
16.9	Operationen an der Mamma	239		(Künstliche Besamung, KB)	252
16.9.1	Nodulektomie	241	17.2.1	Frischsamen	252
16.9.2	Einfache Mastektomie	241	17.2.2	Gekühlter Samen	252
16.9.3	Regionale Mastektomie	241	17.2.3	Tiefgefriersamen	254
16.9.4	Einseitige Ablatio mammae	241	17.3	Andrologische Erkrankungen	256
16.9.5	Einseitige Ablatio mammae und regionale Mastektomie	241	17.3.1	Erkrankungen des Präputiums	256
16.9.6	Beidseitige Ablatio mammae mit Auslassen eines der beiden ersten Thorakalkomplexe	241	17.3.1.1	Präputialausfluss	256
16.9.7	Beidseitige Ablatio mammae	241	17.3.1.2	Ödem	256
16.10	Operation einer Hernia inguinalis	241	17.3.1.3	Verletzungen des Präputiums	256
16.10.1	Kaudaler abdominaler Zugang in der Linea alba	242	17.3.1.4	Hämatome im Präputium	256
16.10.2	Zugang direkt über der Bruchpforte	242	17.3.1.5	Phimose	256
16.11	Operation einer Hernia diaphragmatica	242	17.3.1.6	Paraphimose	257
			17.3.1.7	Pseudophimose	257
17	Andrologie		17.3.1.8	Hypoplasie des Präputiums	257
17.1	Klinisch-andrologische Untersuchung	243	17.3.1.9	Tumoren des Präputiums	257
17.1.1	Anamnese	243	17.3.2	Erkrankungen des Penis	258
17.1.2	Untersuchungsgang	243	17.3.2.1	Präputialkatarrh	258
17.1.2.1	Allgemeine Untersuchung	243	17.3.2.2	Balanoposthitis	258
17.1.2.2	Adspektion von Präputium und Skrotum	243	17.3.2.3	Frenulum praeputii persistens	258
17.1.2.3	Palpation von Präputium, Hoden, Nebenhoden und Samenstrang	244	17.3.2.4	Harnröhrenspalte: Hypospadie, Epispadie (Hyperspadiе)	259
17.1.2.4	Adspektion und Palpation des vollständig vorverlagerten Penis	245	17.3.2.5	Verletzung des Penis	259
17.1.2.5	Rektale Palpation der Prostata	245	17.3.2.6	Penistumoren	260
17.1.2.6	Beurteilung der Mammarkomplexe	245	17.3.2.7	Urethral Schleimhautvorfall	260
17.1.2.7	Beurteilung des Verhaltens bei der Deckung	245	17.3.2.8	Penishypoplasie, Penisaplasie	261
17.1.2.8	Samengewinnung	245	17.3.2.9	Fraktur des Penisknochens (Os priapi)	261
17.1.3	Samenuntersuchung	246	17.3.2.10	Verkalkungen und Verknöcherungen kaudal des Os priapi	262
17.1.3.1	Samenmenge	247	17.3.2.11	Priapismus	262
17.1.3.2	Samenfarbe	247	17.3.3	Erkrankungen des Skrotums	263
17.1.3.3	Samenkonsistenz	247	17.3.3.1	Skrotaldermatitis	263
17.1.3.4	Samen-ph-Wert	247	17.3.3.2	Tumoren des Skrotums	263
17.1.3.5	Samendichte	247	17.3.3.3	Verletzungen	263
17.1.3.6	Motilität der Spermien	248	17.3.3.4	Skrotalhernie	263
17.1.3.7	Unterscheidung lebender und toter Spermien	248	17.3.3.5	Hydrozele	264
17.1.3.8	Gefärbter Ausstrich	248	17.3.4	Erkrankungen des Hodens	264
17.1.3.9	Differenzierung pathologischer Spermien	248	17.3.4.1	Maldescensus testis	264
17.1.4	Alkalische Phosphatase im Samen	250	17.3.4.2	Ectopia testis	265
17.1.5	Hormonuntersuchungen beim Rüden	250	17.3.4.3	Kryptorchismus	265
17.1.6	Bakteriologische Samenuntersuchung	250	17.3.4.4	Samenstrangtorsion	265
17.1.7	Blut- und Harnuntersuchung	250	17.3.4.5	Hodentumoren	266
			17.3.4.6	Orchitis	266
			17.3.4.7	Atrophie des Hodens	266
			17.3.4.8	Aplasie des Hodens	268
			17.3.4.9	Nebenhodenentzündung	268
			17.3.5	Erkrankungen der Prostata	268
			17.3.5.1	Benigne Prostat hypertrophie (Prostat hyperplasie)	268
			17.3.5.2	Chronische benigne Prostat hypertrophie (Prostat hyperplasie), Retroversion der Harnblase und Perinealhernie	269
			17.3.5.3	Akute Prostatitis	269

X Inhalt

17.3.5.4	Chronische Prostatitis	269
17.3.5.5	Prostataabszesse	269
17.3.5.6	Paraprostatiche Zysten (extraprostatiche Zysten)	270
17.3.5.7	Intraprostatiche Zysten	271
17.3.5.8	Prostatatumoren	271
17.3.5.9	Prostataplattenepithelmetaplasie	271
17.3.5.10	Feminisierungssyndrom, Gynäkomastie	272
17.3.5.11	Pseudogynäkomastie	273
17.3.5.12	Mammatumoren	273
17.4	Fruchtbarkeitsstörungen beim Rüden	275
17.4.1	Hormonelle Steuerung der männlichen Genitalfunktionen und Spermiogenese	275
17.4.2	Pathologisches Ejakulat	275
17.4.2.1	Azoospermie	276
17.4.2.2	Oligospermie	276
17.4.2.3	Abnorme Spermienmorphologie (Teratozoospermie)	276
17.4.2.4	Verminderte Motilität (Asthenozoospermie)	276
17.4.3	Retrograde Ejakulation	276
17.5	Andrologische Operationen	277
17.5.1	Kastration	277
17.5.1.1	Präskrotale unbedeckte Kastration	277
17.5.1.2	Präskrotale bedeckte Kastration	277
17.5.1.3	Kastration mit einer Ablatio des Skrotums	277
17.5.2	Maldescensus testis, Ectopia testis	277
17.5.2.1	Hodenpexie	277
17.5.2.2	Hodenexstirpation	277
17.5.3	Kryptorchismus	277
17.5.3.1	Laparotomie	277
17.5.3.2	Endoskopische Vorgehensweise	277
17.5.4	Sterilisation	277
17.5.5	Operation einer Phimose, Paraphimose	278
17.5.6	Operation einer Hypospadie	279
17.5.6.1	Hypospadiapenis-Operation	279
17.5.6.2	Operation einer skrotalen Hypospadie	279
17.5.7	Penisamputation	280
17.5.7.1	Penisteilamputation	280
17.5.7.2	Vollständige Penisamputation	280
17.5.8	Paraprostatiche Zysten	280
17.5.9	Prostatazyten, Prostataabszesse	280
17.5.9.1	Omentalisation	280
17.5.9.2	Marsupialisation	282
17.5.10	Prostataresektion	282
17.5.11	Perinealhernie	282
17.5.11.1	Herniorrhaphie	283
17.5.11.2	Transposition des Musculus obturatorius internus	283
17.5.11.3	Zweiphasenoperation	283

18	Hormonbehandlung	
18.1	Hormonbehandlung beim Rüden	285
18.1.1	Hypersexualität	285
18.1.1.1	Gestagene mit antiandrogener Wirkung	285
18.1.1.2	GnRH-Analoga zur langfristigen Unterdrückung der Libido	285
18.1.2	Beeinflussung der Fertilität	285
18.1.2.1	Unterdrückung der Fertilität	285
18.1.2.2	Stimulation der Libido	285
18.1.2.3	Stimulation der Ejakulation	286
18.1.3	Human Chorion Gonadotropin (HCG)-Stimulationstest	286
18.1.4	Andrologische Erkrankungen	286
18.2	Hormonbehandlung bei der Hündin	287
18.2.1	Scheinträchtigkeit	287
18.2.2	Läufigkeitsverschiebung	288
18.2.2.1	Anabole Steroide	288
18.2.2.2	GnRH-Agonisten	288
18.2.3	Läufigkeitsunterbrechung	289
18.2.4	Östrusinduktion	289
18.2.4.1	Dopaminagonisten	289
18.2.4.2	GnRH-Analoga	289
18.2.4.3	Weitere Protokolle	289
18.2.5	Nidationsverhütung	291
18.2.5.1	Prostaglandine	291
18.2.5.2	Progesteronantagonisten	291
18.2.6	Resorptions- und Abortauslösung	291
18.2.6.1	Progesteronantagonisten	292
18.2.6.2	Progesteronantagonist + Antiprolaktin	292
18.2.6.3	Prostaglandin F _{2α}	293

Anhang

Der Notfallpatient in der Reproduktionsmedizin: Überblick, Verteilerliste	295
Medikamente, die während der Trächtigkeit nicht verabreicht werden sollen	296
Medikamente, die während der Trächtigkeit als letzte Wahl (oder wenn die Vorteile gegenüber den Nachteilen deutlich überwiegen) verabreicht werden sollten	297
Abbildungsnachweis	298
Die DVD zum Buch	299
Stichwortverzeichnis	301

Autoren

Hans-Klaus Dreier
Dr. med. vet.
FTA für Kleintiere
Klinik für Kleintiere
Erzherzogin Isabelle Str. 41
A-2500 Baden

Gilles Dupré
Univ.-Prof., Dr. med. vet., Dipl. ECVS, Leiter der
Klinik für Chirurgie, Augen- und Zahnheilkunde
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien

Valentina Fiorbianco
Dr. med. vet.
Klinik für Chirurgie, Augen- und Zahnheilkunde
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien

Elisabeth Mayrhofer
Univ.-Prof., Dr. med. vet.
Klinik für Bildgebende Diagnostik
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien

Barbara Nell
A. Univ.-Prof., Dr. med. vet., Dipl. ECVO
Klinik für Chirurgie, Augen- und Zahnheilkunde
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien

Sabine Schäfer-Somi
A. Univ.-Prof., Dr. med. vet., Dipl. ECAR
Besamungs- und Embryotransferstation
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien

Gewidmet meiner Frau Christl

Vorwort

Betrachte ich die letzten 40 Jahre des tierärztlichen Berufsstandes, so ist nicht zu übersehen, welchen großen Wandel dieser erfahren hat. Vor vier Jahrzehnten waren reine Kleintierpraxen nur sehr spärlich vorhanden, es dominierten selbst in den Städten die so genannten Gemischtpraxen. Auf dem Land lag der tierärztliche Schwerpunkt hauptsächlich im Nutztierbereich, weshalb sich die Tierärzte nicht oder nur in einem sehr geringen Ausmaß mit der Kleintiermedizin beschäftigt haben. Mit der Zunahme des Wohlstandes einerseits und dem Strukturwandel in der Landwirtschaft andererseits, gewann die Kleintiermedizin wesentlich an Bedeutung, sodass die Anzahl der Praxen und Kliniken für Kleintiere in den Städten deutlich zunahm und auch auf dem Land Kleintierpraxen gegründet wurden. Der Ruf nach einer postgradualen Fort- und Weiterbildung wurde lauter und vor allem durch die private Initiative und das Engagement praktizierender Tierärzte eingeführt und getragen. Der konsequente nächste Schritt war die fachspezifische Spezialisierung innerhalb der Kleintiermedizin. Eine Tatsache, die von den Tierbesitzern gewürdigt und sehr gerne in Anspruch genommen wird.

Im Lichte dieser Entwicklung habe ich mich entschlossen das vorliegende Buch aus dem Blickwinkel meiner langjährigen tierärztlichen Tätigkeit herauszugeben, um den interessierten Tierärztinnen und Tierärzten die Reproduktionsmedizin näher zu bringen. Der Studentenschaft soll mit diesem Buch die Möglichkeit gegeben werden, einen praxisbezogenen Einblick in eine dem letzten Wissensstand entsprechende Spezialdisziplin zu erhalten.

So, wie ich von meinem Lehrer, Prof. Dr. Dr. h.c. Kurt Arbeiter, die Grundbegriffe der Reproduktionsmedizin in den 1970er Jahren in dankenswerter Weise erfahren konnte, so blieb ich auch dem Prinzip der uneingeschränkten Wissensweitergabe treu, wie dies im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen auch von anderen Kollegen gehalten wird.

Ganz frei nach dem Motto »ein Bild ersetzt viele Worte« wurde das vorliegende Buch textlich knapp gehalten, dafür reichlich mit charakteristischen Bildern versehen. Typische vaginoskopische Befunde sind der beigelegten DVD-ROM zu entnehmen. Auf Literaturangaben wurde bei den meisten Kapiteln wegen der textlichen Kürze teilweise oder ganz verzichtet. Auch wenn ich versucht habe, alle Aspekte der Reproduktionsmedizin anzusprechen, wird keineswegs der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Es ist mir ein besonderes Anliegen auf die systematische Umsetzung der Untersuchungsgänge hinzuweisen. Dieses schrittweise Vorgehen wird durch die klare Gliederung, kurze textliche Erklärungen und bildliche Demonstrationen im Buch besonders hervorgehoben. Gleichzeitig möchte ich die Leser animieren, Operationspatienten der Reproduktionsmedizin (Ovariohysterektomie, Kastration, Kaiserschnitt, onkologische Chirurgie) präoperativ genau nach dem vorgeschlagenen Schema zu untersuchen. Wann immer es möglich ist, sollten die gestellten Diagnosen anhand der Operationsorgane kritisch überprüft werden.

Für die sofortige Bereitschaft zur Mitarbeit an diesem Buch darf ich mich bei den mitarbeitenden Damen und Herren Prof. Dr. Gilles Dupré, Dr. Valentina Fiorbianco, Prof. Dr. Elisabeth Mayrhofer, Prof. Dr. Barbara Nell und Prof. Dr. Sabine Schäfer-Somi von der Veterinärmedizinischen Universität Wien recht herzlich bedanken.

Ebenso gilt mein Dank meiner Tochter Dr. Christina Schöpf für die Hilfe bei der Herstellung von vaginalzytologischen Abbildungen sowie Herrn Dr. Markus Kasper für die sehr instruktiven und gelungenen Zeichnungen, die in vielen gemeinsamen Besprechungen konzipiert wurden.

Für die Hilfe bei der Herstellung des Videofilmes »Die vaginalendoskopische Untersuchung« bin ich Herrn Ing. Georg Neumayer und Herrn Mario Schinkel von der Firma Karl Storz zu vielem Dank verpflichtet.

Sehr bedanken möchte ich mich bei Frau Dr. med. vet. Ulrike Oslage (Schlütersche Verlagsgesellschaft), die jederzeit zur Hilfe bereitstand und mit ihrer Ruhe und Ausgeglichenheit eine äußerst angenehme Arbeitsatmosphäre schaffte. Mein Dank gilt auch Frau Marion Lemnitz, die mich als genaue und gewissenhafte Lektorin beeindruckt hat.

Ich hoffe und wünsche, dass dieses Buch allen, die sich mit der Reproduktionsmedizin beim Hund auseinandersetzen, hilfreich sein möge.

Baden, im Oktober 2009

Hans-Klaus Dreier

2 Embryologie der Geschlechtsorgane

1

entstehen die Bänder. Nach der Einwanderung der Urgeschlechtszellen entstehen aus der Rinde der Keimdrüse das Ovar und aus dem Keimdrüsenmark der Hoden.

Aus dem paarig angelegten Müllerschen Gang entwickelt sich der weibliche Genitaltrakt. Die Eileiter haben ihren Ursprung in den kranialen Abschnitten der Müllerschen Gänge. Kaudal vereinigen sich beide Kanäle zum Urovaginalkanal, der durch die Ausbildung des Muttermundes in Uterus und Vagina mit Vestibulum unterteilt wird. Die Uterushörner bleiben paarig. Die Uterindrüsen entstehen postnatal. Die Vagina mündet in den Sinus urogenitalis (Vestibulum vaginae).

Aus den Wolffschen Gängen differenzieren sich die Nebenhoden und die Samenleiter. Im männlichen Embryo wird die Entwicklung der weiblichen Geschlechtsorgane durch das

Wachstumshormon *Müllerian inhibiting substance* (MIS), das in den Sertoli-Zellen des embryonalen Hodens produziert wird, unterdrückt. Zeitgleich produzieren die Leydig-Zellen des Hodens Testosteron, welches die Differenzierung der Wolffschen Gänge fördert (Abb. 1-1) (1).

Literatur

1. MICHEL G.: Kompendium der Embryologie der Haustiere. 4. Aufl. Fischer, Jena, 1986.
2. MEYERS-WALLEN V. N., PATTERSON D. F.: Disorders of sexual development in the dog. In: MORROW D. A. (ed.): Current Therapy in Theriogenology. 2nd ed. W.B. Saunders, Philadelphia, 1986, 567.

2 Anatomie der Geschlechtsorgane

2.1 Weibliche Geschlechtsorgane

Eine anatomische Darstellung der weiblichen Geschlechtsorgane (1, 2) findet sich in Abb. 2.1-1.

Die unbehaarten, wulstförmigen **Schamlippen** (Labiae vulvae; Abb. 2.1-2) bilden die **Schamspalte** (Rima vulvae) und vereinigen sich zur abgerundeten **Commissura dorsalis** und zur spitzwinkligen **Commissura ventralis**.

Zwischen der dorsalen Kommissur und dem Anus befindet sich der **Damm** (Perineum), der bei der Hündin besonders lang ist (siehe Abb. 4.2-23). Die **Labien** sind zumeist unbehaart (Abb. 2.1-2), unterschiedlich stark pigmentiert und dorsal von einer Hautfalte des Perineums unterschiedlich stark überdeckt. Fallweise können die Labien auch behaart sein (Abb. 2.1-3).

Die Haut, die Talg- und Schweißdrüsen enthält, geht am Übergang zum **Scheidenvorhof** (Vestibulum vaginae) in eine kutane Schleimhaut über. Das Vestibulum vaginae ist bei der Hündin lang und bis zum **Hymen** steil gestellt. Im Schei-

denvorhof befindet sich auf der Höhe der ventralen Kommissur in der **Klitorisgrube** (Fossa clitoridis) die **Klitoris** (Clitoris, Kitzler; Abb. 2.1-4). Diese besteht aus einem gut ausgebildeten **Corpus clitoridis** mit einer 4–5 mm großen **Glans** und den beiden etwa 2 cm langen **Crura clitoridis**, die durch das **Septum clitoridis** verbunden und am **Arcus ischiadicus** befestigt sind. Die Klitoris wird von der A. und V. clitoridis versorgt. In den Scheidenvorhof mündet die Harnröhre mit ihrem **Orificium urethrae externum**. In der seitlichen und vor allem in der ventralen Schleimhaut befinden sich die **Glandulae vestibulares minores** mit porenförmigen Öffnungen. Die Grenze zur **Scheide** (Vagina) bildet das Hymen. Die Scheide ist bei einem etwa 25 kg schweren Hund ca. 10–14 cm lang, hat einen Durchmesser von ungefähr 1,5 cm, reicht kranial bis in den peritonealen Bereich der Beckenhöhle und ist mit einer kutanen Schleimhaut versehen. Je nach Zyklusphase hat die Vaginalschleimhaut ein unterschiedliches Aussehen. Kranial wird die Scheide vom Gewölbe mit der **Zervix** (Portio vaginalis uteri), die etwa 0,5–1,0 cm in die Vagina vorragen kann, begrenzt. Im kranialen Scheidenbereich liegt dorsal eine Schleimhautfalte (**Dorsalfalte**; Abb. 2.1-5), die am äußeren

Abb. 2.1-1: Anatomie der inneren weiblichen Geschlechtsorgane.

4 Anatomie der Geschlechtsorgane

2

Abb. 2.1-2:
Schamlippen (Labien). Staffordshire Terrier.

Abb. 2.1-3:
Behaarte Schamlippen (Labien). Deutscher Schäferhund.

Abb. 2.1-4:
Klitoris (Pfeil) in der Klitorisgrube. Bordeaux Dogge.

Abb. 2.1-5:
Dorsalfalte im kranialen Anteil der Vagina. Endoskopische Aufnahme.

Abb. 2.1-6:
Uterus mit Ovarien und Mesometrien. Operationspräparat. 1 = Uteruskörper, 2 = Uterushörner, 3 = Ovarien, 4 = Mesometrien.

Abb. 2.1-7:
Uterusbifurkation (Bifurcatio uteri) mit Ligamentum intercornuale (Pfeil). Operationspräparat.

Muttermund endet und im Anöstrus und in der Nachgeburtsphase (Puerperium) besonders deutlich erkennbar ist. Die Durchblutung erfolgt von der A. und V. vaginalis. Der **Muttermund** (Cervix uteri) ist etwa 1 cm lang, sodass der innere und äußere Muttermund fast zusammenfallen. Die Portio vaginalis uteri liegt im ventralen Teil des kranialen Scheidengewölbes und ragt frei in die Vagina vor. Die Farbe der Vaginal- und Zervikalmukosa ist abhängig von der Zyklusphase (Kap. 5, 6), der Trächtigkeit (Kap. 7, 8), der Geburt (Kap. 9, 10), der Nachgeburtsperiode (Kap. 12, 13) und von Gynäkopathien (Kap. 15). Unabhängig davon können bei Chow-Chow, Eurasier und anderen Rassen unterschiedlich große, flächenhafte, schwarze Pigmentareale nachgewiesen werden. Die Hündin hat einen **Uterus bicornis**. Der 2–3 cm lange unpaare **Uteruskörper** teilt sich in der **Bifurcatio uteri** in die langen paarigen Uterushörner auf, die bei einer mittelgroßen Hündin etwa bleistiftstark sind (Abb. 2.1–6). Im Bereich der Bifurkation befindet sich das **Ligamentum intercornuale** (Abb. 2.1–7).

Die Uterushörner werden von zwei breiten, fetthaltigen **Bauchfellamellen** (Mutterbänder, Mesometrien; Abb. 2.1–6) nach dorsal fixiert und von der A. und V. uterina versorgt. Das **Ligamentum teres uteri** (Abb. 2.1–8) ist mit einer Serosalamelle lateral dem Mesometrium angelegt. Es zieht von der Uterushornspitze durch den inneren Leistenring in den **Processus vaginalis**, der vom Bauchfell und der Fascia transversa gebildet wird.

Die **Eierstöcke** (Ovarien) sind länglich, abgeplattet sowie je nach Größe des Hundes und abhängig von der Zyklusphase bis zu 2 cm lang und 1,5 cm breit. Sie liegen in Höhe des 3./4. Lendenwirbels am kaudalen Nierenpol. Die Ovarien

sind durch das **Mesovar** nach dorsal, durch das **kraniale Gonadenband** (Ligamentum suspensorium ovarii; Abb. 2.1–1, Abb. 2.1–9), das lateral an der Niere vorbeizieht und am Zwerchfellpfeiler endet, nach kranial und durch das kurze **Ligamentum ovarii proprium** (Abb. 2.1–9) nach kaudal zur Uterushornspitze hin fixiert. Da das rechte Mesovar kürzer ist als das linke, liegt das rechte Ovar etwas weiter dorsal. Aus diesem Grund kann die rechte Ovariectomie etwas schwieriger sein als beim linken Ovar.

Das straffe Mesovar, in dem die A. und V. ovarica verlaufen, geht aus dem Mesometrium hervor und ist mit dem kranialen Gonadenband verbunden. Die Eierstöcke liegen in der sehr fetthaltigen **Eierstocktasche** (Bursa ovarica). Auf der medialen Seite dieser Tasche befindet sich das **Ostium bursae ovaricae**, durch das ein Teil des rötlichen **Fimbrientrichters** (Infundibulum tubae uterinae; Abb. 2.1–10) sichtbar sein kann.

Die Öffnung der Bursa ovarica wird dorsal vom Ligamentum ovarii proprium und vom kranialen Gonadenband und ventral vom Fimbrientrichter begrenzt. Auf der lateralen Seite der Eierstocktasche ist fast immer eine fettfreie Stelle, durch die das Ovar sichtbar wird. Der **Eileiter** (Tuba uterina) beginnt mit dem Fimbrientrichter an der ventralen Begrenzung der Öffnung der Bursa ovarica. Die Fimbrienplatte, in deren Mitte das Ostium abdominale tubae liegt, schließt sich dicht an den Eierstock an. Ampulle und Isthmus des Eileiters befinden sich an der medialen Seite der Bursa ovarica, bogenförmig verläuft der Eileiter auf die laterale Seite der Eierstocktasche und mündet durch das Ostium uterinum tubae, eine in das Uteruslumen vorspringende Papille, in das Gebärmutterhorn.

2

Abb. 2.1-8:
Das Ligamentum teres uteri verläuft von der Uterushornspitze im Mesometrium in den Processus vaginalis. Operationspräparat. 1 = Ansatzstelle des Lig. teres uteri an der Uterushornspitze, 2 = Lig. ovarii proprium, 3 = Ostium bursae ovaricae.

Abb. 2.1-9:
Bänder im Bereich Uterushornspitze, Bursa ovarica und Mesovar. Operationspräparat. 1 = Uterushornspitze, 2 = Ligamentum ovarii proprium, 3 = Ostium bursae ovaricae, 4 = kraniales Gonadenband, 5 = Bursa ovarica.

Abb. 2.1-10:
Auf der medialen Seite der Eierstocktasche ist das Ostium bursae ovaricae, durch das der rote Fimbrientrichter sichtbar sein kann. Operationspräparat. 1 = Uterushornspitze, 2 = Ostium bursae ovaricae, 3 = Fimbrientrichter.

2.2 Männliche Geschlechtsorgane

Der **Hodensack** (Skrotum) liegt zwischen den Oberschenkeln und besteht aus der Haut, der oberflächlichen und tiefen Rumpffaszie, der Muskelschicht, der Fascia transversa abdominis und dem Bauchfell. Im Skrotum befinden sich die rundlich-ovalen, prall-elastischen horizontal liegenden **Hoden** (Testis). Der rechte Hoden liegt leicht erkennbar höher (Abb. 2.2-1, Abb. 2.2-2). Jeder Hoden hat eine derbe bindegewebig-elastische Kapsel (**Tunica albuginea testis**), mit welcher das Bauchfell (**Lamina visceralis** der Tunica vaginalis testis, Abb. 2.2-3) verbunden ist. Die **Nebenhoden** (Epididymis) sind groß. Sie liegen mit dem verdickten **Kopf** (Caput epididymidis) am kranialen Hodenpol, mit dem schlanken **Körper** (Corpus epididymidis) am lateralen und

dorsalen Rand und mit dem wieder vergrößerten **Schwanz** (Cauda epididymidis) am kaudalen Ende des Hodens. Hoden und Nebenhoden sind durch das **Ligamentum testis proprium** fixiert. Das **Lig. caudae epididymidis** verbindet den Nebenhodenschwanz und den kaudalen Anteil des Processus vaginalis peritonaei (Abb. 2.2-4, Abb. 2.2-5). Im Proc. vaginalis liegt der **Samenstrang** (Funiculus spermaticus), der aus Ductus deferens, Arteria und Vena testicularis, Ramus genitalis des Nervus genitofemoralis, Lymphgefäßen und Musculus cremaster externus besteht. Die **Samenleiter** (Ductus deferentes) sind dickwandig, gelangen durch den Leistenring in die Bauchhöhle, haben knapp vor der Prostata eine **geringgradige Erweiterung** (Ampulla ductus deferentis) und verengen sich dann zu den in der Prostata liegenden **Ductus ejaculatorii**, die in einen **kammartigen Samenhügel**

Abb. 2.2-1:
Physiologische Hoden. Der rechte Hoden ist immer etwas höher gelagert als der linke Hoden. Deutscher Boxer.

Abb. 2.2-2:
Physiologische Hoden. Der rechte Hoden liegt näher zu der Regio inguinalis als der linke Hoden. Berner Sennenhund.

Abb. 2.2-3:
Von den Hodenhüllen bedeckter Hoden. Operationspräparat. Rauhaardackel.

Abb. 2.2-4:
Hodenhüllen sind entfernt, laterale Ansicht. Hoden, Nebenhoden (1 = Kopf, 2 = Körper, 3 = Schwanz), Band des Nebenhodenschwanzes (= 4), Samenstrang (= 5; Funiculus spermaticus) sind sichtbar. Labrador.

Abb. 2.2-5:
Hodenhüllen sind entfernt, mediale Ansicht. Hoden, Nebenhoden (1 = Kopf, 2 = Schwanz), Band des Nebenhodenschwanzes (= 3) und Samenstrang (Funiculus spermaticus) sind sichtbar. Labrador.

2

Abb. 2.2-6:
Nicht erigierter Penis. 1 = Pars longa glandis; 2 = Bulbus glandis.

Abb. 2.2-7:
Erigierter Penis um 180 Grad nach kaudal verlagert. Großer Schweizer Sennenhund. 1 = Pars longa glandis; 2 = Bulbus glandis.

Abb. 2.2-8:
Penisknochen (Os priapi). Ventralansicht mit Sulcus urethralis. Der eingeführte Harnröhrenkatheter demonstriert den Verlauf der Harnröhre.

Abb. 2.2-9
Penisknochen (Os priapi). Latero-dorsale Ansicht. Links an der Penisknochen- spitze fehlt der fibröse knorpelige Anteil.

(Colliculus seminalis) münden. Bei den **Ostia ejaculatoria** vereinigen sich die Harn- und Samenröhre, um dann in einem kaudoventralen Bogen zum Penis zu führen.

Die **Prostata** ist die einzige akzessorische Geschlechtsdrüse des Rüden. Sie liegt beim jugendlichen und mittelalten Hund am Beckenboden nahe zum Beckeneingang. Beim älteren Rüden liegt sie vor dem Becken im Abdomen. Die Prostata ist relativ groß (abhängig von Rasse und Alter), zweilappig, gelblich, derbelastisch mit einer glatten Oberfläche und umfasst den Blasenhalshals sowie das Anfangsstück der Harnröhre vollständig.

Der **Penis** (Abb. 2.2-6, Abb. 2.2-7) liegt im **Präputium** und besteht aus der Glans bulbi, dem Corpus und der Glans penis. Der Rüde hat einen **Penisknochen** (Os priapi; Abb. 2.2-8, Abb. 2.2-9), der ein fast dreikantiger, hohlsondenförmiger Knochen ist. Die ventrale Fläche besitzt eine Rinne (Sulcus

urethralis; Abb. 2.2-8), in der die Harnröhre verläuft. Der kraniale Anteil ist schwächer ausgebildet, rundlich und hat keine Rinne (ca. ein Viertel der Gesamtlänge). Der Penisknochen kann 10 cm und länger sein. Das **Corpus cavernosum penis** beginnt paarig als **Crura penis**, die ihren Ursprung am Sitzbein haben. Im Bereich des Peniskörpers werden sie zum unpaaren Corpus cavernosum. Der Schwellkörper ist von der straffen Tunica albuginea umgeben.

Literatur

1. ELLENBERGER W., BAUM H.: Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. 18. Aufl. Springer, Berlin, 1943.
2. NICKEL R., SCHUMMER A., SEIFERLE R.: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Parey, Berlin, Hamburg, 1960.

3 Deckverhalten

Die Läufigkeit bedingt eine Verhaltensänderung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Hündin vermehrt am äußeren Genitale schleckt, öfter Harn in kleinen Mengen absetzt (Markieren, Abb. 3-1), weniger gehorsam ist, streunt und den Kontakt zum Rüden sucht.

Während der Läufigkeit zeigt der Rüde gesteigertes Interesse an der Hündin und demonstriert den Besitzanspruch durch Markieren auf Harn und Kot der Hündin (Abb. 3-1, Abb. 3-2). Im Proöstrus animiert sie zwar den Rüden, duldet das Aufspringen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jedoch nicht. Erst im Östrus ist sie deckbereit («Stehphase»). Riecht

und/oder schleckt der Rüde am Genitale der Hündin, dreht sie den Schwanz zur Seite oder stellt ihn hoch auf (Abb. 3-3), bringt die Vulva in eine etwa horizontale Position (Präsentieren) und gestattet dem Rüden, sie zu besteigen, zu klammern und den nicht vollständig erigierten Penis in die Vagina einzuführen (Abb. 3-4). Dabei wird das Vorsekret (Prostata) in geringer Menge abgegeben. Nach heftigen Friktionsbewegungen ist der Penis voll erigiert, der Rüde steigt um (Abb. 3-5) und gibt die Samenhauptfraktion ab (Abb. 3-6). Im Hängen, das bis zu 60 und mehr Minuten dauern kann, wird das Nachsekret (Prostata) in großer Menge abgesondert (Abb. 3-6).

Abb. 3-1: Während der Läufigkeit setzt die Hündin öfters Harn in kleinen Mengen ab (Markieren). Der Rüde beriecht den Harn der Hündin. Große Schweizer Sennenhunde.

Abb. 3-2: Der Rüde markiert den Harn der Hündin. Große Schweizer Sennenhund.

Abb. 3-3: Leicht auslösbarer Genitalreiz durch Beriechen und/oder Beschlecken der Vulva. Große Schweizer Sennenhunde.

Abb. 3-4: Der Rüde besteigt die Hündin, klammert sie und führt den nicht vollständig erigierten Penis in die Vagina ein. Große Schweizer Sennenhunde.

10 Deckverhalten

3

Abb. 3-5:
Ist der Penis voll erigiert, steigt der Rüde um (1).

Abb. 3-6:
Der Rüde gibt im Hängen die Samenhauptfraktion ab. Das Hängen kann bis zu 60 und mehr Minuten dauern. Dabei wird das Nachsekret abgesondert. Große Schweizer Sennenhunde.

Abb. 3-7:
Tier-Tier-Beziehung. Berner Sennenhund und Hauskatze (eigene Patienten, in der Klinik fotografiert). Das im Bild gezeigte Verhalten der beiden Jungtiere widerspricht dem landläufigen Spruch »Wie Hund und Katze«.

Bei der Auswahl der Zuchthunde sollte besonderes Augenmerk auf deren Charakter gelegt werden, um der Tier-Mensch-Beziehung, aber auch der Tier-Tier-Beziehung gerecht zu werden. Nicht nur Tiere mit »anerkanntem Zuchtfehler« (wie z. B. einem fehlenden Prämolaren), sondern auch Tiere, die aggressives Verhalten zeigen, sollten vorrangig selektiert werden. Das Hetzen von Hunden auf Katzen zur jagdlichen Ausbildung sowie die Ausbildung zu Kampfhunden sind strikt abzulehnen. Eine Auswahl der Zuchttiere muss immer auch auf der Grundlage des Charakters getroffen werden (Abb. 3-7).

Literatur

1. GRANDAGE J. (1972): The erect dog penis: a paradox of flexible rigidity. Vet. Rec. **91**: 141-147.

4 Gynäkologie (Theriogenologie)

4.1 Physiologie

4.1.1 Geschlechtsreife (Pubertät)

Die **Pubertät** tritt bei der Hündin im Alter von sechs bis 18 Monaten und zwei bis drei Monate früher als beim Rüden ein. Kleinhunde werden früher geschlechtsreif als Großrassen. Der Zeitpunkt ist abhängig vom genetischen Material und von den Haltungsbedingungen. Frei und halbfrei lebende Hündinnen werden früher läufig als im Zwinger oder in Wohnungen gehaltene Tiere.

4.1.2 Normozyklus

In der Regel werden die meisten Hündinnen zweimal im Jahr läufig (92,5 %). Es kommt jedoch auch vor, dass die Läufigkeiten alle vier Monate (2,5 %) oder nur alle zwölf Monate (5,0 %) nachzuweisen sind. Fallweise werden sogar vier Läufigkeiten pro Jahr beobachtet.

Die Länge des Anöstrus ist nicht nur individuell verschieden, es gibt auch rassebedingte Unterschiede (1). So zeigten in einer Studie 25 % von insgesamt 57 Deutschen Schäferhündinnen verkürzte Zyklen (2). Die Verkürzung des Sexualzyklus auf vier (± 1) Monate kann mit Fertilitätsstörungen einhergehen, da nicht genug Zeit für die Endometriumregeneration zur Verfügung steht und das Fehlen der Ovulationen oder eine frühzeitige Rückbildung der Gelbkörper ursächlich sein können (3).

Algorithmus 4.1-1:
Anzahl der Läufigkeiten pro Jahr.

Der Normozyklus wird in den **Proöstrus** (PÖ; 6–8 Tage), **Östrus** (Ö; 4–8 Tage), **Metöstrus** (MÖ; 50–55 Tage) und **Anöstrus bzw. Ruhephase** (AÖ; 2–10 Monate) unterteilt.

Die Läufigkeit umfasst den Proöstrus, den Östrus und den sehr frühen Metöstrus. In dieser Zeit verliert die Hündin Läufigkeitssekret in unterschiedlicher Farbe. Die Läufigkeit dauert im Durchschnitt drei Wochen, sollte jedoch nicht länger als 28 Tage anhalten.

Wesentlich ist, dass die Läufigkeiten in regelmäßigen Abständen auftreten und immer in etwa gleich lang sind. Abweichungen können auf hormonelle Störungen oder interne Erkrankungen hinweisen.

Algorithmus 4.1-2:
Gliederung des Sexualzyklus.

4.1.3 Zuchtreife

Die Zuchtreife wird in der Regel mit der zweiten Läufigkeit erreicht und tritt je nach Rasse in unterschiedlichem Alter ein (früh- und spätreife Rassen). Die Zuchtreife wird von den Zuchtverbänden festgelegt.

4.1.4 »Wechsel« bei der Hündin

Die Hündin wird bis ins hohe Alter läufig. Es gibt keinen Wechsel wie bei der Frau. Die Läufigkeitsintervalle können länger werden, der Östrus kann kürzer sein und insgesamt sind die Läufigkeitsmerkmale oft schwächer ausgebildet.

4.1.5 Hormonelle Steuerung des Sexualzyklus

Algorithmus 4.1-3:
Hormonelle Steuerung des Sexualzyklus. (Grafik erstellt von Julia Maderner.)

Das hormonelle Geschehen wird vom Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH), von den Gonadotropinen follikelstimulierendes Hormon (FSH), luteinisierendes Hormon (LH), luteotropes Hormon (LTH, Prolaktin) und von den Sexualsteroiden (Östrogen, Progesteron) gesteuert. GnRH wird im Hypothalamus sezerniert. Die Synthese und Ausschüttung der Gonadotropine FSH, LH und LTH erfolgt im Hypophysenvorderlappen. Der Produktionsort für 17β -Östradiol ist die Follikelwand (Abb. 4.1-1). Für das Progesteron sind es zunächst die Granulosazellen der Follikel, postovulatorisch dann die Gelbkörper (Corpora lutea; Abb. 4.1-2–4.1-7). GnRH

veranlasst die Ausschüttung von FSH und LH, die am Ovar die Anbildung und Reifung der Follikel verursachen. Die in den reifen Follikeln vermehrt gebildeten Östrogene bewirken durch Rückkopplung mit positiver Reaktion (positiver Feedback-Mechanismus) eine gipfelartige LH-Ausschüttung (LH-Peak), die unter Mitwirkung der Hyaluronidase zwei bis drei Tage später die Ovulationen auslöst (4, 5).

Der Sexualzyklus wird von der Gonadotropinsekretion des Hypophysenvorderlappens gesteuert. Die hormonale Situation um den Ovulationszeitpunkt untersuchten 1972 PHEMISTER et al. (6). Neben histologischen Befunderhebungen an Ovar und Eileiter wurden Blutkonzentrationen von Östrogen, Progesteron und luteinisierendem Hormon (LH) durchgeführt. Die Verfasser stellten fest, dass die Ovulationen bei den meisten Hündinnen am zweiten oder dritten Tag des Östrus erfolgen, nachdem am Beginn des Östrus ein LH-Peak nachgewiesen wurde. 1973 berichteten JONES et al. (7) über das Ergebnis von Hormonanalysen bei drei zyklischen Beaglehündinnen. Demnach steigt die Östradiol- 17β -Konzentration im PÖ an. Am höchsten liegt der Wert einen Tag vor dem LH-Peak (50–100 pg/ml). Die LH-Höchstkonzentration wurde am ersten oder zweiten Tag des Östrus nachgewiesen. Progesteron steigt im Östrus an und erreicht im MÖ seinen höchsten Wert (ca. 16 ng/ml). Die Verfasser meinen, dass die LH-Ausschüttung vom Östrogenanstieg im PÖ abhängig ist. In den letzten Jahren sind an normozyklischen Tieren zahlreiche hormonanalytische Untersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen durchgeführt worden. Über die Serum- bzw. Plasmakonzentrationen des LH gibt es unterschiedliche Berichte. Der Grund dafür dürfte in den verschiedenen Hormonpräparationen der verwendeten Assays liegen (8–17).

Die LH-Ausschüttung erfolgt pulsatil und die Intervalle variieren von weniger als einer Stunde bis zu mehr als sieben Stunden. Der Beginn der verstärkten Sekretion war häufig mit dem frühen Proöstrus oder den letzten ein bis zwei Wochen des Anöstrus in Zusammenhang zu bringen. Diese LH-Sekretion ist als kompetente wellenförmige Stimulierung der Follikelentwicklung anzusehen (18). LH wirkt luteotrop. Die LH-Grundsekretion ist für die Progesteronausschüttung erforderlich (19).

Follikelstimulierendes Hormon (FSH) erreicht im Anöstrus Werte von 260 ± 30 ng/ml und fällt während des Proöstrus auf etwa 140 ng/ml ab (11). Dieser FSH-Abfall wird durch ein Östrogen-bedingtes negatives Feedback verursacht. In der präovulatorischen Phase steigen LH und FSH gleichzeitig an. FSH hat im Gegensatz zu LH zwei bis vier Erhöhungen, die um ein bis zwei Tage länger als beim LH nachzuweisen sind (20).

1971 bestimmten CHRISTIE et al. (8) bei 16 Beaglehündinnen den Progesteron Gehalt im Blut. Dieser betrug im PÖ 1–3 ng/ml, im Ö ungefähr 15 ng/ml und im MÖ bis zu 20,3 ng/ml. Im Anöstrus (AÖ) ermittelten sie Werte um 2 ng/ml.

Abb. 4.1-1:
Ovulationsreife Follikel. 17β-Östradiol 50 pg/ml, Progesteron 8 ng/ml. Operationspräparat. Mischling.

Abb. 4.1-2:
Gelbkörper in Anbildung. Progesteron 17 ng/ml. Golden Retriever.

Abb. 4.1-3:
Gelbkörper in Blüte. Progesteron 32 ng/ml. Golden Retriever.

Abb. 4.1-4:
Gelbkörper in Rückbildung. Progesteron 6 ng/ml. Rottweiler.

Abb. 4.1-5:
Alte Gelbkörper. Ovar 1,1 cm × 0,5 cm. Drei alte Gelbkörper, kleine Follikel; Progesteron und 17β-Östradiol nicht messbar. Aufnahme mit Makroobjektiv. Pekinese.

Abb. 4.1-6:
Ovar ohne Funktionskörper. 1,2 cm × 0,5 cm, Progesteron und 17β-Östradiol nicht messbar. Aufnahme mit Makroobjektiv. Irish Setter.

Abb. 4.1-7:
Ovar ohne Funktionskörper. Imposante kirschgroße Serosazyste, die hormonell bedeutungslos ist. Irish Setter.

Abb. 4.1-8: Normozyklus vom zweiten bis zum 58. Zyklustag. Die Östradiol-17β-Konzentration steigt im Proöstrus an. Am höchsten liegt der Wert (110 pg/ml) einen Tag vor dem LH-Peak. Die LH-Höchstkonzentration ist an den ersten beiden Tagen des Östrus. Progesteron steigt im Proöstrus und Östrus an und erreicht im Metöstrus seinen höchsten Wert. Rottweiler, eineinhalb Jahre.

Eigene Hormonuntersuchungen bei 30 Hündinnen verschiedener Rassen (Rottweiler, Deutsche Schäferhunde, Boxer, Dackel und Pudel) bezogen auf die zyklischen Veränderungen der Vaginalschleimhaut ergaben, dass Östradiol-17β am fünften Zyklustag (PÖ) den höchsten Wert mit durchschnittlich 110 pg/ml erreicht und Progesteron mit einem Mittelwert von 3 ng/ml nachzuweisen ist. Am Übergang PÖ/Ö (um den 10. Zyklustag) erreichten **Östradiol-17β** 90 pg/ml und Progesteron 15 ng/ml. Am Ende des Östrus (postovulatorisch) lagen die durchschnittlichen Östradiolwerte bei 50 pg/ml und jene des Progesteron bei 28 ng/ml. Im MÖ (um den 30. Zyklustag) konnten die höchsten Progesteronkonzentrationen (40 ng/ml) ermittelt werden. Ab diesem Zeitpunkt sank Progesteron im peripheren Blut kontinuierlich ab: 15 ng/ml am 50., 8 ng/ml am 60., 4 ng/ml am 70. und 2 ng/ml am 80. Zyklustag. Östradiol-17β konnte am 50. Zyklustag im Durchschnitt noch mit 4 pg/ml nachgewiesen werden (21).

Prolaktin fluktuiert während des PÖ, Ö und vor der Implantation nur geringfügig (11, 15). In der zweiten Hälfte der Trächtigkeit steigt LH leicht an und es wurden ungefähr zehn Prolaktinerhöhungen registriert, während bei der nichtträchtigen Hündin nur ein bis drei Erhöhungen festgestellt wurden (22–24). Die höchsten Prolaktinspiegel von 12 ng/ml und 3 ng/ml wurden bei trächtigen und nichtträchtigen Hündinnen zwischen dem 55. und 60. Tag nach dem LH-Peak beobachtet (25).

Androgene wurden sowohl während der Follikelperiode als auch während der Gelbkörperphase bei der Hündin bestimmt. Serumtestosteron beträgt im Anöstrus generell weniger als 0,2 ng/ml und steigt während des Proöstrus leicht an (0,3–1,0 ng/ml), um in der Gelbkörperperiode abzusinken und niedrig zu bleiben. Serumandrostendion erreicht im Proöstrus Werte von 0,6–2,3. Diese Werte bleiben während des Metöstrus erhöht, um dann um den Geburtszeitpunkt abrupt abzufallen (26–28).

Die Östradiol-17β-Konzentration steigt im Proöstrus an. Am höchsten liegt der Wert (110 pg/ml) einen Tag vor dem LH-Peak. Die LH-Höchstkonzentration ist an den ersten beiden Tagen des Östrus. Progesteron steigt im Proöstrus und Östrus an und erreicht im MÖ seinen höchsten Wert (Abb. 4.1-8).

Östradiol-17β und Progesteron werden in den Labors für die Praxis routinemäßig bestimmt. Luteinisierendes Hormon (LH) wird im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen nachgewiesen. Im Klinik- bzw. Praxisbetrieb müsste LH mehrmals täglich und über mehrere Tage bestimmt werden, um den LH-Peak nicht zu übersehen, was die wirtschaftlichen Interessen der Züchter bei Weitem überschreiten würde. Zur Bestimmung der Zyklusphasen und des günstigsten Deckzeitpunktes werden daher folgende Kriterien herangezogen:

- Klinisch-gynäkologische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der vaginalen Beurteilung.
- Vaginalzytologie.
- Progesteronbestimmung.

Interpretation von Laborwerten

Die Untersuchungsergebnisse werden von den einzelnen Labors in unterschiedlichen SI-Einheiten angegeben: Progesteron entweder in ng/ml bzw. nmol/l und Östradiol in pg/ml bzw. in pmol/l. Um die unterschiedlichen Angaben vergleichbar zu machen, gelten folgende Umrechnungsfaktoren:

- Progesteron = 3,18
 - ng/ml × 3,18 = nmol/l
 - nmol/l : 3,18 = ng/ml
- Östradiol = 3,67
 - pg/ml × 3,67 = nmol/l
 - nmol/l : 3,67 = pg/ml

Literatur

1. SOKOLOWSKI J. H. (1977): Reproductive patterns in the bitch. *Vet. Clin. North. Am.* **7**: 653–666.
2. GÜNZEL-APEL A. R., ZABEL S., BUNCK C. F., DIELEMAN S. J., EINSPIANIER A., HOPPEN H. O. (2006): Concentrations of progesterone, prolactin and relaxin in the luteal phase and pregnancy in normal and short-cycling German Shepherd dogs. *Theriogenology*. **66**: 1431–1435.
3. ROMAGNOLI S. E., CAMILLO F., CELA M., JOHNSTON S. D., GRASSI F., FERDEGHINI M., ARIA G. (1993): Clinical use of prostaglandin F2 alpha to induce early abortion in bitches: serum progesterone, treatment outcome and interval to subsequent oestrus. *J. Reprod. Fertil. Suppl.* **47**: 425–431.
4. HASE M., HORI T., KAWAKAMI E., TSUTSUI T. (2000): Plasma LH and progesterone levels before and after ovulation and observation of ovarian follicles by ultrasonographic diagnosis system in dogs. *J. Vet. Med. Sci.* **62**: 243–248.
5. CONCANNON P., TSUTSUI T., SHILLE V. (2001): Embryo development, hormonal requirements and maternal responses during canine pregnancy. *J. Reprod. Fertil. Suppl.* **57**: 169–179.
6. PHEMISTER R. D., HOLST A. P., SPANO J. S., HOPWOOD L. M. (1972): Time of ovulation in the beagle bitch. *Biol. Reprod.* **8**: 74–82.
7. JONES E. G., BOYNS A. R., CAMERON E. H., BELL E. T., CHRISTIE D. W., PARKES M. F. (1973): Plasma oestradiol, luteinizing hormone and progesterone during the oestrus cycle in the beagle bitch. *J. Endocrinol.* **57**: 331–332.
8. CHRISTIE D. W., BELL E. T., HORTH C. E., PALMER R. F. (1971): Peripheral plasma progesterone levels during the canine oestrus cycle. *Acta. Endocrinol.* **68**: 543–550.
9. SMITH M. S., McDONALD L. E. (1974): Serum levels of luteinizing hormone and progesterone during the estrous cycle, pseudopregnancy in the dog. *Endocrinology* **94**: 404–412.
10. NETT T. M., AKBAR A. M., PHEMISTER R. D., HOLST P. A., REICHERT L. E. Jr., NISWENDER G. D. (1975): Levels of luteinizing hormone, estradiol and progesterone in serum during the estrous cycle and pregnancy in the Beagle bitch. *Proc. Soc. Exptl. Biol. Med.* **148**: 134–139.
11. EDQUIST L. E., JOHANSSON E. D., KASSTROM H., OLSSON S. E., RICHKIND M. (1975): Blood plasma levels of progesterone and oestradiol in the dog during the oestrus cycle and pregnancy. *Acta. Endocrinol.* **78**: 554–564.
12. CONCANNON P. W., HANSEL W. (1975): Effects of estrogen and progesterone on plasma LH, sexual behavior and pregnancy in Beagle bitches. *Fed. Proc.* **34**: 323.
13. CONCANNON P. W., HANSEL W., McENTEE K. (1977): Changes in LH, progesterone and sexual behavior associated with preovulatory luteinization in the bitch. *Biol. Reprod.* **17**: 604–613.
14. AUSTAD R., LUNDE A., PEARSON O. V. (1976): Peripheral plasma levels of oestradiol-17 beta and progesterone in the bitch during the oestrous cycle, in normal pregnancy and after dexamethasone treatment. *J. Reprod. Fertil.* **46**: 129–136.
15. WILDT D. E., PANKO W. B., CHAKRABORTY P., SEAGER S. W. (1979): Relationship of serum estrone, estradiol-17 beta and progesterone to LH, sexual behavior and time of ovulation in the bitch. *Biol. Reprod.* **20**: 648–658.
16. OLSON P., BOWEN R., BEHRENDT M., OLSON J. D., NETT T. M. (1982): Concentrations of reproductive hormones in canine serum throughout late anestrus, proestrus and estrus. *Biol. Reprod.* **27**: 1196–1206.
17. CHAKRABORTY P. K. (1987): Reproductive hormone concentration during estrus, pregnancy and pseudopregnancy in the Labrador bitch. *Theriogenology*. **27**: 827–840
18. CONCANNON P.W., WHALEY S., P.S. ANDERSON (1986): Increased LH pulse frequency associated with termination of anestrus during the ovarian cycle of the dog. *Biol. Reprod.* **34** (Suppl.), 119 (Abstract).
19. CONCANNON P. W., WEINSTEIN P., WHALEY S., FRANK D. (1987): Suppression of luteal function in dogs by luteinizing hormone antiserum and bromocriptine. *J. Reprod. Fertil.* **19**: 1113–1118.
20. REIMERS T., PHEMISTER R., NISWENDER G. (1978): Radioimmunological measurement of follicle stimulating hormone and prolactin in the dog. *Biol. Reprod.* **19**: 673–679.
21. DREIER H. K., CORETH H., KOPFSCHITZ M. M. (1987): Progesteron- und Östrogenbestimmung bei der Hündin im Verlauf des Normo- und Pathozyklus. *Kleintierprax.* **32**: 337–342.
22. GRAF K. J. (1978): Serum oestrogen, progesterone and prolactin concentrations in cyclic, pregnant and lactating beagle dogs. *J. Reprod. Fertil.* **52**: 9–14.
23. De COSTER R., BECKERS J. F., BEERENS D., DeMAY J. (1983): A homologous radioimmunoassay for canine prolactin: plasma levels during the reproductive cycle. *Acta. Endocrinol.* **103**: 473–478.
24. FERNANDEZ P. A., BOWEN R. A., KOSTAS A. C., SAWYER H. R., NETT T. M., OLSON P. N. (1987): Luteal function in the bitch: changes during diestrus in pituitary concentration of and the number of luteal receptors of luteinizing hormone and prolactin. *Biol. Reprod.* **37**: 804–811.
25. McCANN J. P., TEMPLE M., CONCANNON P. W. (1987): Pregnancy-specific alterations in the metabolic endocrinology of domestic dogs including insulin resistance and modified regulation of growth hormone secretion. *Proceedings of the 11th International Congress on Animal Reproduction and Artificial Insemination, University College Dublin*, 103.
26. CONCANNON P. W., CASTRACANE V. D. (1982): Serum androstendione and testosterone concentrations during pregnancy and nonpregnant cycles in dogs. *Biol. Reprod.* **33**: 1078–1083.
27. CONCANNON P. W. (1985): Endocrinology of canine estrous cycles, pregnancy and parturition. *Proceedings of the Society Theriogenology, Denver, 1984, Society for Theriogenology, Hastings, Nebraska*, 1–24.
28. OLSON P. N., BOWEN R. A., BEHRENDT M. D., OLSON J. D., NETT T. M. (1984): Concentrations of testosterone in canine serum during late anestrus, proestrus, estrus and early diestrus. *Am. J. Vet. Res.* **45**: 145–148.

4.2 Klinisch-gynäkologische Untersuchung

4.2.1 Erforderliche Ausrüstung

Für die vaginale Inspektion sind für die unterschiedlich großen Hündinnen eine Reihe von Vaginoskopen, mit einem Handgriff mit einer integrierten Lichtquelle oder einem Griff, der an eine Kaltlichtquelle angeschlossen ist, erforder-

lich (Abb. 4.2-1, 4.2-2, Tab. 4.2-1). Steht ein Endoskop zur Verfügung, so kann der Untersucher bei besserer Ausleuchtung und gleichzeitiger Vergrößerung die Genitalschleimhaut deutlich besser beurteilen. Eine Videokamera und ein Monitor ermöglichen die Befunderhebung und -diskussion in einer Gruppe.

Für die Gewinnung vaginalzytologischen Materials sind eine Drahtöse (Abb. 4.2-3), die auf einem langen Stiel aufgesetzt ist, und entfettete Objektträger erforderlich.

Abb. 4.2-1:
Für die vaginale Untersuchung sind eine Reihe von unterschiedlich großen Vaginoskopen, die der Größe der Patienten angepasst sind, erforderlich. 1 bis 3 in unterschiedlicher Länge für die Geburt, 4 bis 9 für alle anderen Fälle.

Abb. 4.2-2:
Vaginoskop mit Handgriff, in dem eine Lichtquelle integriert ist.

Tab. 4.2-1: Indikation und Beschreibung der Vaginoskope aus Abbildung 4.2-1

Vaginoskop	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikation	GBH	GBH	GBH	GYN	GYN	GYN	GYN	GYN	GYN
Rasse	GrRa	MiRa	KlRa	GrRa	MiRa	MiRa	MiRa	ZwRa	ZwRa
Länge in Zentimeter ohne Mandrain	28	22	20	24	20	17	17	17,5	14,5
Außendurchmesser in Millimeter	18	18	16	12	8	8	8	4	3

GBH = Geburtshilfe; GYN = Gynäkologie; GrRa = große Rassen wie z. B. Neufundländer; KlRa = kleine Rassen wie z. B. Cockerspaniel; MiRa = mittelgroße Rassen wie z. B. Deutscher Schäferhund; ZwRa = Zwergassen wie z. B. Yorkshireterrier.

Abb. 4.2-3:
Drahtöse für die Gewinnung vaginalzytologischen Materials.

Abb. 4.2-4:
Halten der Hündin für die vaginale Untersuchung.

4.2.2 Anamnese

In der Anamnese werden die folgenden Angaben erfasst:

- Alter
- Rasse
- Erkrankungen
- Impfungen und Entwurmungen
- Fütterung
- Art der Haltung (Haus, Zwinger)
- Verwendungszweck (Zuchthund, Sporthund, Begleithund)
- Erste Läufigkeit, Läufigkeitsintervalle, Dauer und Intensität früherer Läufigkeiten
- Scheinträchtigkeit
- Hormonelle Behandlungen
- Deckverhalten
- Künstliche Besamung (KB)
- Trächtigkeitsverlauf, Trächtigkeitsdauer
- Anzahl der Geburten, Verlauf der Geburten
- Wurfgrößen
- Verlauf des Puerperiums
- Eklampsie
- Verlauf der Aufzucht
- Mutter-Neonaten-Verhältnis
- Anzahl abgegebener Junghunde

4.2.3 Untersuchungsgang

Der klinisch-gynäkologische Untersuchungsgang erfolgt konsequent in folgender Reihenfolge:

- Allgemeinuntersuchung
- Adspektion
 - Beurteilung der Labien
 - Beurteilung des Abdomens

- Beurteilung des Scheidenausflusses
- Beurteilung des Genitalreflexes
- Inspektion von Vestibulums
- Inspektion von Vagina und Zervix
 - Untersuchung mit Vaginoskop und Endoskop
- Vaginalzytologie
- Palpation von Uterus und Gesäuge
- Laboruntersuchungen
 - Blutuntersuchung
 - Hormonbestimmung in Serum und Plasma
 - Mikrobiologische und serologische Untersuchung
- Bildgebende Verfahren
 - Sonografische Untersuchung
 - Radiologische Untersuchung

4.2.3.1 Allgemeine Untersuchung

Beurteilt werden Allgemeinverhalten, Nährzustand, Haar- kleid, Hautoberfläche, Hautelastizität, Hauttemperatur, innere Körpertemperatur, Schleimhäute (Lidbindehaut, Mundhöhle), Lymphknoten, Puls, Atmung, Lunge und Herz (Auskultation).

4.2.3.2 Adspektion

Der Patient wird am Tisch im Stehen untersucht und von einer Tierarzthelferin so gehalten, dass ein Arm unter das Abdomen gelegt wird, um das Niedersetzen zu verhindern. Mit dem zweiten Arm werden Hals und Kopf fixiert. Ist der Tierbesitzer anwesend, so hält dieser Hals und Kopf, was gleichzeitig, mit wenigen Ausnahmen, beruhigend für den Patienten ist. Die Hilfsperson hält mit dem unter den Bauch geführten Arm gleichzeitig den Patienten und den Schwanz zur Seite (Abb. 4.2-4).