de Gruyter Lehrbuch

Notfall- und Intensivmedizin

2. Auflage

Mit Beiträgen von

J. Brachlow, P. Brockerhoff, R. Brost, W. Dick, B. Dirks, B. Eberle,
D. Elich, S. Ellmauer, S. Friesecke, D. Gillmann-Blum, J. Grönniger,
B. Hall, M. Harloff, W. Heinrichs, H.-J. Hennes, L. Hofmann,
K. G. Kanz, C. Kelbel, R. Kentner, G. Krämer, Ch. K. Lackner,
M. Lipp, J. Lorenz, B. Maier, D. Mauer, B. Monz, G. Müller-Esch,
D. Nast-Kolb, T. Pop, Th. Reinhardt, St. Ruchholtz, M. Ruppert,
E. E. Scheller, J. E. Schmitz, Th. Schneider, H.-P. Schuster, P. C. Scriba,
S. Schuster, L. S. Weilemann, Chr. Waydhas, J. Widmann

Notfall- und Intensivmedizin

2., vollständig überarbeitete Auflage

Herausgegeben von W. Dick

unter Mitarbeit von H.-P. Schuster

Walter de Gruyter
Berlin · New York 2001

Herausgeber

Prof. Dr. med. Dr. h. c. W. Dick
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Prof. Dr. med. H.-P. Schuster
Medizinische Klinik I
Städtisches Krankenhaus
Weinberg 1, 31134 Hildesheim

Das Buch enthält 200 Abbildungen und 39 Tabellen

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Notfall- und Intensivmedizin / hrsg. von W. Dick unter Mitarb. von H.-P. Schuster. [Mit Beitr. von J. Brachlow ...]. – 2., vollst. überarb. Aufl. – Berlin ; New York : de Gruyter, 2001
(De-Gruyter-Lehrbuch)
ISBN 3-11-015346-7

© Copyright 2000 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 10785 Berlin.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Verlag hat für die Wiedergabe aller in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) mit Autoren und Herausgebern große Mühe darauf verwandt, diese Angaben genau entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abzdrukken. Trotz sorgfältiger Manuskripterstellung und Korrektur des Satzes können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber

und Verlag übernehmen in folgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dergleichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.

Satz: Arthur Collignon GmbH, Berlin – Druck: Gerike GmbH, Berlin – Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer GmbH, Berlin – Zeichnungen: H. R. Giering-Jänsch, Berlin – Umschlagentwurf: Rudolf Hübler, Berlin

Printed in Germany

Vorwort

Auch die 2. Auflage des Lehrbuchs „Notfall- und Intensivmedizin“ hat zum Ziel, die zusammenhängenden Themenbereiche „Symptomatologie und erste Versorgung der akut lebensbedrohlichen Zustände“, „Notfallmedizin“ und „Grundlagen der Intensivmedizin“ als gemeinsames Konzept darzustellen.

Herausgeber, Autoren und Verlag haben dazu die mit der ersten Auflage gemachten Erfahrungen – vor allem Rückmeldungen und Anregungen – dankbar aufgegriffen und in der Neuauflage weitgehend umgesetzt. Der Inhalt des Buches richtet sich auch weiterhin am traditionellen Gegenstandskatalog aus, da die Approbationsordnung nach wie vor nicht novelliert wurde. Damit hat die Neuauflage gleichermaßen die Verpflichtung, dem Studenten Orientierung für die Kurse „Erste ärztliche Hilfe“ sowie „Notfallmedizin“ zu geben und das Wissen von Notfall- und Intensivmedizin zu vermitteln, das in den verschiedenen Abschnitten der ärztlichen Prüfung präsentiert werden muß.

Die Neuauflage soll aber auch dem Arzt im Praktikum die Grundkenntnisse vermitteln, die er für die außer- wie innerklinische Notfallmedizin sowie die Grundlagen der Intensivmedizin und ihre Anforderungen benötigt. Der Status des AiP schützt unter den Bedingungen des zunehmenden Kostendrucks in den Kliniken junge Kolleginnen und Kollegen weder vor notfall- noch vor intensivmedizinischer Verantwortung. In einigen Bundesländern ist allerdings inzwischen die Notfallmedizin zur Zusatzbezeichnung weiterentwickelt worden. Damit entfällt in diesen Ländern der Druck der Krankenhausträger auf AiP's, Notarztwagen besetzen zu müssen. Die meisten Landesärztekammern sind jedoch bisher diesem Beispiel noch nicht gefolgt; vermutlich werden AiP's in

diesen Bundesländern nach wie vor als Notärzte eingesetzt, obwohl sie die dazu nötige theoretische und praktische Erfahrung nicht haben können.

Zugleich wurde in der Neuauflage Wert darauf gelegt, die Notfallmedizin als präklinische Intensivmedizin bzw. die Intensivmedizin als innerklinische Notfallmedizin mit erweiterten und verbesserten Möglichkeiten innerhalb des Gesamtkonzeptes darzustellen.

Der Stoffkatalog und seine Darstellung sind wesentlich verkürzt, die in der ersten Auflage als Konzept enthaltene „Randleiste“ zur Schnellorientierung ist eliminiert worden.

Dafür wurde der Text zum Teil schlagwortartig im „Telegrammstil“ präsentiert, eine Form der Darstellung, die hier und dort gewöhnungsbedürftig sein kann, andererseits aber die Konzentration auf das Wesentliche erleichtert.

Vor allen Dingen wurde Wert darauf gelegt, Redundanzen zu vermeiden, die in der ersten Auflage zwangsläufig enthalten waren.

Damit erwirbt der Leser konzentriertes Fachwissen, das durch Experten dem aktuellen Stand des Wissens adaptiert wurde und unnötigen Ballast vermeidet. Daraus resultiert letztlich Lerneffizienz.

Notfall- und Intensivmedizin sowie Versorgung des kritisch kranken Patienten gehören unabdingbar zusammen; der Student muß sich in den verschiedenen Abschnitten des Studiums über unterschiedliche notfall- und intensivmedizinische Zusammenhänge orientieren. Das Buch soll ihm diese Aufgabe erleichtern: zum einen durch die erforderliche Vollständigkeit des Stoffes, weitestgehende Komprimierung des Wissensumfangs, zum anderen durch Vermeidung von Redundanzen.

Für all diejenigen jungen Kolleginnen und Kollegen, die nach Abschluß des Studiums in

den Bereichen Notfallmedizin, Intensivmedizin, Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Chirurgie, Geburtshilfe, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie tätig sind, wird das Buch als Orientierungsquelle dienen können. Daneben sollte es auch für medizinische Assistenz-

berufe wie Rettungsassistenten, Pflegekräfte auf Intensivstationen und in Notaufnahmebereichen wertvolle Anregungen liefern.

Mainz, Hildesheim, im Dezember 2000

W. Dick, H.-P. Schuster

Vorwort zur 1. Auflage

Mit dieser – als Lehrbuch bezeichneten – Zusammenstellung der „Symptomatologie und ersten Versorgung der akut lebensbedrohenden Zustände“ sowie der „Grundlagen der Intensivmedizin“ nach dem Gegenstandskatalog Medizin möchten Herausgeber, Autoren und Verlag den bereits durch andere Fachgebiete erfolgreich unternommenen Versuch wiederholen, die zum Verständnis von Zusammenhängen notwendige Ausführlichkeit eines Lehrbuches mit der Kürze eines Repetitoriums zu kombinieren. Sie waren sich dabei der besonderen Aufgabenstellung um so mehr bewußt, als mit der 7. Änderung der Approbationsordnung für Ärzte über den bisherigen Kurs „Erste Ärztliche Hilfe“ hinaus zwingend ein Kurs „Notfallmedizin“ vorgeschrieben wurde. In diesem neuen Kurs ab 1993 muß auch intensivmedizinisches Wissen vermittelt werden, ist dies doch im Gegenstandskatalog ausdrücklich vorgesehen.

Bisher fehlte eine intensivmedizinische Zusammenstellung, die sich auf das für den Studenten in den letzten Semestern und dem praktischen Jahr sowie den Arzt im Praktikum notwendige Wissen konzentriert. Das mag auch daran liegen, daß selbst die 7. Änderung der Approbationsordnung für Ärzte keine Intensivmedizin als Lehrangebot vorsieht, jedoch im zweiten Abschnitt der ärztlichen Prüfung vom Studenten zwingend solche Kenntnisse verlangt.

Wenngleich sich Herausgeber und Autoren im wesentlichen am Gegenstandskatalog orientiert haben, so wurde darüber hinaus auch versucht, die „Grenze des Staatsexamens“ zu überschreiten und Zusammenhänge zu vermitteln, die den jungen approbierten Arzt gerade in den ersten Jahren seiner Weiterbildung in der Klinik interessieren.

Andererseits haben die Herausgeber bewußt vermieden, spezielle Notfälle der verschiedenen Fachgebiete in diese Zusammenstellung aufzunehmen, da diese in den jeweiligen fachbezogenen Lehrbüchern in extenso dargestellt sind. Allenfalls da, wo übergreifende Probleme evident sind, wurden solche fachspezifischen Aspekte berücksichtigt (z. B. für die Geburt oder für gynäkologische Notfälle, wenn sie unter Blutungen und Verletzungen oder „akutem Abdomen“ zu subsumieren waren).

Wir sind der Überzeugung, daß Notfallmedizin und Intensivmedizin von der Thematik her eng zusammengehören, sich gegenseitig ergänzen und damit in einem Buch zusammengefaßt werden sollten. So muß auch nicht von ungefähr der Arzt, der den Fachkundenachweis Rettungsdienst erwerben will, eine mindestens einjährige Tätigkeit in der Intensivmedizin nachweisen; umgekehrt kommt der Intensivmediziner kaum ohne notfallmedizinische Kenntnisse aus. Notfall- und Intensivmedizin bietet ihm komprimiertes Wissen in einem Lehrbuch/Merkbuch.

Wir hoffen, daß dieser erste Anlauf zur kombinierten Vermittlung von Verständnis und Zusammenhängen einerseits sowie rasch repetierbarem Examenswissen andererseits wenigstens teilweise gelungen ist. Über konstruktive Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Allen Autoren sowie dem de Gruyter-Verlag und seinen Mitarbeitern, allen voran Herrn PD Dr. Radke sei für das außerordentliche Engagement, die jederzeit konstruktive Zusammenarbeit und das breite Verständnis beim Entstehen dieses Buches herzlich gedankt.

Mainz, Hildesheim,
im April 1992

W. Dick
H.-P. Schuster

Anschriften der Autoren

Dr. J. Brachlow
Anästhesiologieabteilung
Kreiskrankenhaus Bad Schwalbach
Emser Straße 29–31, 65307 Bad Schwalbach

Prof. Dr. P. Brockerhoff
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. F. R. Brost
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Prof. Dr. Dr. W. Dick
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. B. Dirks
Sektion Notfallmedizin
Universitätsklinikum Ulm
Prittwitzstraße 43
89075 Ulm

Dr. B. Eberle
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. D. Elich
Abteilung für Anästhesiologie
Dreifaltigkeitshospital
Klosterstraße 31, 59555 Lippstadt

Dr. S. Ellmayer
Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin
Städt. Krankenhaus München-Bogenhausen
Engschalkinger Straße 77, 81925 München

Dr. Sigrun Friesecke
Abteilung Innere Medizin II
Kreiskrankenhaus
Paulmannshöher Straße 14, 58515 Lüdenscheid

Dr. Dagmar Gillmann-Blum
Welschstraße 5, 55131 Mainz

Prof. Dr. J. Grönniger
Zentrum für Chirurgie
Klinikum Minden
Friedrichstraße 17, 32427 Minden

Dr. Birgit Hall
Oldenfelder Straße 32, 22143 Hamburg

Dr. M. Harloff
Medizinische Klinik I
St. Elisabeth-Krankenhaus Saarlouis
Kapuzinerstraße 4, 66740 Saarlouis

Prof. Dr. W. Heinrichs
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. H.-J. Hennes
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. L. Hofmann
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. K. G. Kanz
Chirurgische Klinik und Poliklinik
Klinikum der Universität München – Innenstadt
Nußbaumstraße 20, 80336 München

Dr. C. Kelbel
Innere Abteilung II
Kreiskrankenhaus Lüdenscheid
Paulmannshöher Straße 14, 58515 Lüdenscheid

Dr. R. Kentner
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. G. Krämer
Schweizerische Epilepsie-Klinik
Bleulerstraße 60, 8008 Zürich / Schweiz

Dr. Ch. K. Lackner
Arbeitskreis Notfallmedizin
und Rettungswesen
Nußbaumstraße 20, 80336 München

Prof. Dr. Dr. M. Lipp
Klinik für Anästhesiologie
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Prof. Dr. J. Lorenz
Innere Abteilung II
Kreiskrankenhaus Lüdenscheid
Paulmannshöher Straße 14, 58515 Lüdenscheid

Dr. B. Maier
KKH Sigmaringen
Hohenzollernstraße 40, 72488 Sigmaringen

Dr. D. Mauer
Deutsche Stiftung Organtransplantation
Emil-von-Behring-Passage
63263 Neu-Isenburg

Dr. Brigitta Monz
Käthe-Kollwitz-Weg 96, 89081 Ulm

Prof. Dr. G. Müller-Esch
Zentrum für Innere Medizin
Klinikum Konstanz
Luisenstraße 7, 78464 Konstanz
D. Nast-Kolb

Prof. Dr. T. Pop
I. Medizinische Abteilung
Allgem. Krankenhaus Harburg
Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg

Dr. Th. Reinhardt
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
Postfach 25 03 62, 67035 Ludwigshafen

Dr. St. Ruchholtz
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie
Universitätsklinikum Essen
Hufelandstraße 55, 45147 Essen

M. Ruppert
Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen
Nußbaumstraße 20, 80336 München

Dr. E. E. Scheller
Traumat. Abteilung der Chirurgischen Klinik
Klinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin

Prof. Dr. J. E. Schmitz
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH
Ludwig-Ehrhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden

Dr. Th. Schneider
Alte Gärtnerei 18, 55128 Mainz

Prof. Dr. H.-P. Schuster
Medizinische Klinik I
Städtisches Krankenhaus
Weinberg 1, 31134 Hildesheim

PD Dr. S. Schuster
St. Antonius Hospital
Kardiologie
47533 Kleve

Prof. Dr. P. C. Scriba
Medizinische Klinik Innenstadt
Ludwig-Maximilians-Universität
Ziemssenstraße 1, 80336 München

Prof. Dr. Chr. Waydhas
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie
Universitätsklinikum Essen
Hufelandstraße 55, 45147 Essen

Prof. Dr. L. S. Weilemann
II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Dr. J. Widmann
Chirurgische Klinik und Poliklinik
Klinikum der Universität München – Innenstadt
Nußbaumstraße 20, 80336 München

Inhalt

1 Elementare Vitalfunktionen – Notfall, Notsituation 1

W. Dick

1.1	Untersuchung auf vitale Funktionsstörungen	2	1.1.3	Herz-Kreislauf-Funktion	8
1.1.1	Hirnfunktion	3	1.1.4	Wasser-Elektrolyt-Haushalt	9
1.1.2	Atemfunktion	4	1.1.5	Pathophysiologische Verknüpfung	9

2 Akute Störungen der Vitalfunktionen, Behandlungsprinzipien 10

2.1	Rettung, Bergung, Lagerung	10	2.4	Schmerzbekämpfung, Sedierung, Notfallanästhesie	28
	<i>J. Brachlow, T. Schneider</i>			<i>B. Maier, B. Dirks</i>	
2.1.1	Rettungsgriffe, Helmabnahme	10	2.4.1	Schmerz, Analgesie	28
2.1.2	Lagerung	13	2.4.2	Analgetika	28
2.1.2.1	Störung elementarer Vitalfunktionen	13	2.4.2.1	Nichtopioidanalgetika, Spasmodolytika	31
2.1.2.2	Gynäkologisch-geburtshilflicher Notfall, spezielle Verletzungen	17	2.4.2.2	„Zentral“ wirkende Analgetika: Opioidanalgetika, Ketamin, N ₂ O	36
2.2	Blutstillung, Wundbehandlung	20	2.4.2.3	Praktische Schmerztherapie	45
	<i>E. E. Scheller, J. Grönninger</i>		2.4.3	Sedierung: Sedativa, Hypnotika	46
2.2.1	Blutstillung	20	2.4.3.1	Benzodiazepine	46
2.2.2	Wundbehandlung	21	2.4.3.2	Neuroleptika	48
2.3	Fraktur, Amputatversorgung	23	2.4.3.3	Sonstige Sedativa, Hypnotika	49
	<i>Chr. K. Lackner, St. Ruchholtz, D. Nast-Kolb</i>		2.4.4	Anästhesie im Notfall	50
2.3.1	Frakturversorgung	23	2.4.4.1	Lokal-, Leitungsanästhesie	50
2.3.2	Amputationsverletzung, Notamputation, Replantation	26	2.4.4.2	Notfallnarkose (Allgemeinanästhesie)	52

3 Akute Störungen der Atemfunktion 58

3.1	Sofortmaßnahmen	58	3.1.3	Koniotomie	67
	<i>M. Lipp</i>		3.2	Beatmung	68
3.1.1	Freie Atemwege, Fremdkörperentfernung	58		<i>M. Lipp</i>	
3.1.1.1	Freimachen der Atemwege ohne Hilfsmittel	58	3.2.1	Ohne Hilfsmittel	68
3.1.1.2	Freimachen der Atemwege mit Hilfsmitteln	60	3.2.1.1	Technik	68
3.1.1.3	Freihalten der Atemwege	61	3.2.1.2	Beatmungseinschränkung	69
3.1.2	Endotracheale Intubation	62	3.2.2	Mit Hilfsmitteln	69
			3.3	Spezielle Erscheinungsbilder	70
			3.3.1	Spannungspneumothorax	70
				<i>M. Lipp</i>	

3.3.2	Atemwegverlegung, Trachea-, Bronchienverletzung	71	3.3.5.2	Ertrinken	77
	<i>M. Lipp</i>		3.3.6	Obstruktive Atemweg- erkrankungen	78
3.3.2.1	Verlegung der Atemwege	71		<i>D. Gillmann-Blum, J. Lorenz</i>	
3.3.2.2	Verletzung von Trachea, Bron- chien	72	3.3.6.1	Asthma bronchiale	79
3.3.3	Atemlähmung	72	3.3.6.2	Chronische Bronchitis, Lungen- emphysem	85
	<i>M. Lipp</i>		3.3.7	Lungenembolie	89
3.3.4	Störung der Atemmechanik	73		<i>S. Friesecke, J. Lorenz</i>	
	<i>J. Gröniger</i>		3.3.8	Lungenödem	93
3.3.4.1	Thoraxtrauma	74		<i>S. Friesecke, J. Lorenz</i>	
3.3.5	Störung des Gasaustausches . . .	76	3.3.9	Pleuraerguß	94
	<i>M. Lipp</i>			<i>C. Kelbel, J. Lorenz</i>	
3.3.5.1	Lungenkontusion	77	3.3.10	Spontanpneumothorax	96
				<i>C. Kelbel, J. Lorenz</i>	
4	Störung der Herz-Kreislauf-Funktion	98			
4.1	Allgemeine Sofortmaßnahmen . .	98	4.4	Schock	124
	<i>H.-P. Schuster</i>			<i>W. Heinrichs</i>	
4.1.1	Sauerstofftherapie	98	4.4.1	Ursache, Pathogenese, Pathophy- siologie, Auswirkungen	124
4.1.2	Hypovolämie, Volumen-, Plas- maersatz	98	4.4.1.1	Makrozirkulationsstörung	124
4.1.2.1	Vasodilanzien	100	4.4.1.2	Mikrozirkulationsstörung	126
4.1.3	Positiv inotrope Pharmaka: Katecholamine, Herzglykoside, Phosphodiesterasehemmer	103	4.4.1.3	Hämostasestörung	128
4.2	Herz-Kreislauf-Stillstand (HKS)	105	4.4.1.4	Schockmediator	128
	<i>D. Mauer, W. Dick</i>		4.4.1.5	Organe im Schock	130
4.3	Kardiopulmonale Reanimation (CPR)	108	4.4.2	Klinik, Diagnostik, Differential- diagnostik	130
	<i>D. Mauer, W. Dick</i>		4.4.2.1	Schockstadium	130
4.3.1	Geschlossene CPR: Thorax- druckmassage	110	4.4.2.2	Symptome	130
4.3.2	Offene CPR	110	4.4.2.3	Diagnostik	131
4.3.3	CPR-Algorithmus	111	4.4.3	Volumenmangelschock	134
4.3.3.1	Freimachen der Atemwege, Beat- mung	111	4.4.3.1	Hämorrhagischer Schock:	134
4.3.3.2	Mechanische Wiederbelebung, . .	112	4.4.3.2	Volumenmangelschock bei Dehydration	137
4.3.3.3	Elektrische Wiederbelebung Defibrillation, Schrittmacher . . .	114	4.4.4	Schock bei vasal-peripherem Versagen	139
4.3.4	Medikamente	116	4.4.4.1	Septisch-toxischer Schock	139
4.3.4.1	Katecholamine (KA)	117	4.4.4.2	Anaphylaktischer Schock	141
4.3.4.2	Säure-Basen-, Elektrolythaus- halt	118	4.4.4.3	Neurogener Schock	141
4.3.4.3	Atropin, Volumensubstitution, Glukose	119	4.5	Hypertensive Krise	142
4.3.5	Zerebrale Reanimation	119		<i>T. Pop</i>	
4.3.6	Kontrolle	119	4.6	Akute Störung der Herzfunktion: Kardiogener Schock	143
4.3.7	Prognose	120		<i>T. Pop</i>	
4.3.8	Beendigung	122	4.6.1	Akuter Myokardinfarkt	144
4.3.9	Komplikationen	122	4.6.2	Sonderform des Schocks: In- farktkomplikationen, Herzfehler	147
4.3.10	Praktisches Vorgehen bei HKS . .	122	4.6.3	Differentialdiagnose, Therapie . .	148
			4.6.4	Rhythmusstörung	149
			4.6.4.1	Syndrom des kranken Sinus- knotens	149

4.6.4.2	Atrioventrikulärer Block III. Grades	151	4.8.1	Akuter arterieller Gefäßver- schluß, Embolie	168
4.6.4.3	AV-junktionale Reentry-, WPW- Tachykardie	151	4.8.2	Rupturiertes Aortenaneurysma .	168
4.6.4.4	Vorhofflimmern, Vorhofflattern	152	4.9	Gynäkologischer und geburtshilf- licher Notfall	170
4.6.4.5	Kammertachykardie	153		<i>P. Brockerhoff</i>	
4.6.5	Instabile Angina pectoris	154	4.9.1	Verletzung, Blutung, Entzün- dung, Tumor	170
4.6.6	Kardiales Lungenödem	155	4.9.2	Abort, Extrateringravidität, Trauma in der Spätschwangerschaft . . .	171
4.7	Thermischer, chemischer Schaden	156	4.10	Akutes Abdomen, gastrointesti- nale Blutung	173
4.7.1	Verbrennung, Verbrühung	156		<i>J. Grönniger</i>	
	<i>Chr. K. Lackner, J. Widmann, M. Ruppert</i>		4.10.1	Akutes Abdomen, Abdominal- trauma	173
4.7.2	Verätzung	162	4.10.2	Gastrointestinale Blutungen . . .	175
	<i>B. Eberle</i>				
4.8	Gefäßverschluß, rupturiertes Aor- tenaneurysma	168			
	<i>J. Grönniger</i>				

5 Akute Störung des Bewußtseins 177

5.1	Leitsymptom, Erstmaßnahme	177	5.2.4	Exogene Intoxikation	208
	<i>G. Krämer</i>			<i>M. Harloff</i>	
5.1.1	Leitsymptome	177	5.2.4.1	Giftnotrufzentrale, Diagnostik, Giftelemination, Antidota	208
5.1.2	Diagnostik	186	5.2.4.2	Spezielle Vergiftung	213
5.2	Spezielle Erscheinungsbilder	187	5.3	Weitere Krankheiten mit Bewußt- seinsstörung	217
5.2.1	Schädel-Hirn-Trauma (SHT)	187		Überhitzungsschaden	217
	<i>H.-J. Hennes, B. Monz</i>		5.3.1	<i>B. Eberle</i>	
5.2.1.1	Pathophysiologie	188	5.3.1.1	Hitzesyndrome, -krampf, -erschöp- fung, Hitzschlag	218
5.2.1.2	Präklinische Therapie	190	5.3.1.2	Sonnenstich (UV-Strahlung)	221
5.2.1.3	Klinische Therapie	192	5.3.2	Unterkühlung	221
5.2.1.4	Intensivtherapie	192		<i>B. Eberle, S. Ellmauer</i>	
5.2.2	Intrakranielle Blutung	193	5.3.2.1	Systemische Hypothermie	221
	<i>H.-J. Hennes, B. Monz</i>		5.3.2.2	Lokaler Kälteschaden (Erfrie- rung)	228
5.2.3	Endokrin-metabolisches Koma	196	5.3.3	Status epilepticus	229
	<i>G. Müller-Esch, P. C. Scriba</i>			<i>G. Krämer</i>	
5.2.3.1	Coma diabeticum	196	5.3.4	Schlaganfall (akute zerebrale Ischämie, intrakranielle Blu- tung)	231
5.2.3.2	Hypoglykämie-Syndrom, hypo- glykämischer Schock	198		<i>G. Krämer</i>	
5.2.3.3	Coma hepaticum	200	5.3.5	Sinusthrombose (Hirnvenenthrombose)	232
5.2.3.4	Coma uraemicum	201		<i>G. Krämer</i>	
5.2.3.5	Thyreotoxische Krise	202	5.3.6	Akuter, nichttraumatischer Querschnitt	233
5.2.3.6	Myxödem-Koma	203		<i>G. Krämer</i>	
5.2.3.7	Addison-Krise	204	5.3.7	Bakterielle Meningitis	234
5.2.3.8	Hypophysäres Koma	205		<i>G. Krämer</i>	
5.2.3.9	Akutes Cushing-Syndrom	205	5.3.8	Herpes-simplex-Enzephalitis (HSE)	235
5.2.3.10	Kritischer Diabetes insipidus (D. p.)	205			
5.2.3.11	Syndrom der inappropriaten ADH-Sekretion (SIADH)	206			
5.2.3.12	Hyperkalzämische Krise	206			
5.2.3.13	Akuter Hypoparathyreoidismus	207			

6 Fachübergreifender Notfall: Polytrauma, Krampfanfall in der Schwangerschaft 236	
6.1 Polytrauma	236
<i>B. Eberle</i>	
6.1.1 Präklinische Traumaversorgung	237
6.1.1.1 Lebensrettende Sofortmaßnahmen (A-B-C-D)	237
6.1.1.2 Versorgung von Einzelverletzungen	242
6.1.3.3 Intubation, Beatmung	245
6.1.2 Klinische Traumaversorgung	247
<i>Chr. K. Lackner, D. Nast-Kolb, Chr. Waydhas, K. G. Kanz</i>	
6.2 Koma u. Krampfanfall in der Schwangerschaft	251
<i>P. Brockerhoff</i>	
7 Notfallausrüstung 253	
7.1 Notfallkoffer	253
<i>M. Lipp</i>	
7.2 Notfallmedikamente, Infusionslösungen, Antidote	258
<i>Th. Reinhardt, H.-J. Hennes</i>	
7.2.1 Notfallmedikamente, Applikation	258
7.2.1.1 Applikationsformen	258
7.2.1.2 Notfallmedikamente	259
7.2.2 Infusionslösungen	270
7.2.3 Antidote	271
7.3 Notarztwagen (NAW), Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	274
<i>J. Brachlow, T. Schneider</i>	
7.4 Grundbegriffe des Rettungsdienstes	275
<i>T. Schneider, J. Brachlow</i>	
8 Grundlagen der Intensivmedizin 278	
8.1 Aufwacheinheit, Wachstation, Intensivbehandlungseinheit	278
<i>F. Brost, W. Dick</i>	
8.2 Akute respiratorische Insuffizienz	281
<i>W. Heinrichs</i>	
8.2.1 Pathophysiologie	285
8.2.1.1 Lungenödem, ARDS	286
8.2.2 Therapiemethoden	292
8.2.2.1 Sauerstofftherapie	292
8.2.2.2 Atemtherapie	295
8.2.2.3 Intubation, Tracheotomie	296
8.2.2.4 Maschinelle Beatmung: Grundbegriffe, Form, Geräte	299
8.2.2.5 Klinik der maschinellen Beatmung	308
8.2.2.6 Entwöhnung nach maschineller Beatmung	310
8.2.2.7 Komplikation der maschinellen Beatmung	311
8.2.2.8 Weitere Maßnahmen bei maschineller Beatmung	311
8.2.3 Intensiv-, Respiratortherapie	312
8.2.3.1 Status asthmaticus, chronisch obstruktive Lungenkrankheiten	312
<i>C. Kelbel, J. Lorenz</i>	
8.2.3.2 Lungenembolie, Lungenödem	315
<i>S. Friesecke, J. Lorenz</i>	
8.3 Akute kardiozirkulatorische Insuffizienz	317
<i>L. S. Weilemann, S. Schuster</i>	
8.3.1 Pathophysiologie	317
8.3.2 Intensivmedizinische Überwachung	319
8.3.2.1 Klinische Überwachung	319
8.3.2.2 Nichtinvasive Überwachung	319
8.3.2.3 Invasive Überwachung	323
8.3.3 Intensivtherapie bei häufigen Notfällen	334
8.3.3.1 Pumpversagen	334
8.3.3.2 Herzrhythmusstörung	335
8.3.3.3 Kreislaufregulationsstörung	337
8.3.3.4 Hypertensive Krise	337
8.3.3.5 Intensivtherapie des SHT	337
8.4 Infusionstherapie, enterale, parenterale Ernährung	338
<i>J. E. Schmitz</i>	
8.4.1 Flüssigkeits-, Elektrolyt-, Säuren-Basen-Status	338
8.4.1.1 Wasser-Natrium-Status: Dehydratation, Hyperhydratation	338
8.4.1.2 Elektrolytstatus	340
8.4.1.3 Säuren-Basen-Status	343
8.4.2 Postaggressionsstoffwechsel	345
8.4.3 Substrate, Infusions- u. Ernährungstherapie	347

8.4.3.1	Energieliefernde Substrate	347	8.5.1.2	Pulmonale Komplikation, Sepsis, Infektion	359
8.4.3.2	Proteinbausteine	348	8.5.1.3	ANV (Schockniere)	359
8.4.3.3	„Kleine Nährstoffe“ (Vitamine und Spurenelemente)	349	8.5.1.4	Gerinnungsstörung, Fettembolie	359
8.4.3.4	Ernährungs- und Infusions- therapie	350	8.5.2	Verbrennung	361
8.4.3.5	Enterale Ernährung	350		<i>L. Hofmann</i>	
8.4.3.6	Infusions- und Ernährungsthera- pie im Erwachsenenalter	352	8.5.3	Geburtshilfliche Komplikation .	365
8.4.4	Überwachung der Infusions- und Ernährungsbehandlung	354		<i>D. Elich, D. Mauer</i>	
8.4.5	Applikationstechnik, Zugangs- weg, enterale Applikation	355	8.5.3.1	Präeklampsie, Eklampsie, HELLP-Syndrom	365
8.5	Besonderheit der Intensiv- behandlung	356	8.5.3.2	Blutung, Koagulopathie	366
8.5.1	Polytrauma, -komplikation	356	8.5.4	Blutreinigung: Niereninsuffi- zienz, Hämofiltration, Dialyse . . .	367
	<i>L. Hofmann</i>			<i>R. Kentner, D. Mauer</i>	367
8.5.1.1	Herz-Kreislauf-Versagen (HKS)	357	8.5.5	Sepsis, Sepsissyndrom, Multi- organversagen	370
				<i>B. Hall</i>	
			8.6	Hyperbare Oxygenierung (HBO)	373
				<i>F. Brost</i>	

Abkürzungen

a	Jahr	EVP	evozierte Potentiale
ABSARRH	Arrhythmia absoluta	evtl.	eventuell
ADH	antidiuretisches Hormon	EZR	Extrazellulärraum
AF	Atemfrequenz		
AG	Atemgeräusch	FFP	Fresh-Frozen-Plasma
Amp.	Ampulle	F _i O ₂	fraction of inspired oxygen
AMV	Atemminutenvolumen	FK	Fremdkörper
ANV	akutes Nierenversagen		
art.	arteriell	GCS	Glasgow Coma Scale, Glasgow-Komaskala
AS	Aminosäure	GFP	gefrorenes Frischplasma
ASS	Acetylsalicylsäure	Ggs.	(im) Gegensatz
ASY	Asystolie	haupts.	hauptsächlich
AVB	atrioventrikulärer Block	Hb	Hämoglobin (g %)
AVK	(periphere) arterielle Verschlusskrankheit	Herz-Echo	Echokardiographie, Ultraschallkardiographie
AZ	Allgemeinzustand	HF	Herzfrequenz
BÄK	Bundesärztekammer	HIV	humanes Immundefizienzvirus
bakt.	bakteriell	HK	Hämatokrit
BB	Blutbild	HKS	Herz-Kreislauf-Stillstand
bes.	besonders	HMV	Herzminutenvolumen
Bez.	Bezeichnung	HVL	Hypophysenvorderlappen
BG	Blutgruppe	HVLI	Hypophysenvorderlappeninsuffizienz
BGA	Blutgasanalyse	HWS	Halswirbelsäule
BtMVV	Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung	HWZ	Halbwertszeit
BWS	Brustwirbelsäule	i. d. R.	in der Regel
BZ	Blutzucker	ICP	intrakranieller Druck
		IL	Interleukine
CBF	zerebraler Blutfluß	IMV	Intermittierend Mandoratory Ventilation
CCT	kraniale Computertomographie	Ind.	Indikation
chir.	chirurgischen, chirurgisch	inf.	infolge
chron.	chronisch	INN	Internationaler Freiname von pharmazeutischen Grundsubstanzen
CI	cardiac index, Herzindex	INR	international normalized ratio
COX	Cyclooxygenase	insp.	inspiratorisch
CPR	kardiopulmonale Reanimation	Intox.	Intoxikation
CVVH	kontinuierliche venovenöse Hämo-filtration	IPPV	Intermittierend Positive Pressure Ventilation
e. b.	endobronchial	IZR	Intrazellulärraum
EK	Erythrozytenkonzentrat	KA	Katecholamine
Entz.	Entzündung	KHK	Herzkrankheit, koronare
Erw.	Erwachsene (r)	Klin., klin.	Klinik, klinisch
EtCO ₂	endexpiratorische Kohlendioxidkonzentration		

KOF	Körperoberfläche	RPF	renaler Plasmafluß
KS	Klopfschall	RR	Blutdruck
		RTH	Rettungshubschrauber
LA	Lokalanästhetikum	RTW	Rettungswagen
MEES	Mainz Emergency Evaluation Score	s, sec, Sek.	Sekunden
MAP	mittlerer arterieller Blutdruck	SaO ₂	arterielle Sauerstoffsättigung
Max.	Maximum	SBH	Säure-Basen-Haushalt
MCL	Medioklavikularlinie	SBS	Säure-Basen-Status
mechan.	mechanisch	SHT	Schädel-Hirn-Trauma
MG	Molekulargewicht	SAR	Subarachnoidalraum
Min., min	Minute	SM	Herzschrittmacher
		s. l.	sublingual
n.	nach	s. o.	siehe oben
NaBi	Natriumbicarbonat	Sono	Sonographie
NAW	Notarztwagen	S _p O ₂	partiell-arterielle Sauerstoffsättigung (Pulsoximeter)
NN	Nebenniere	SSW	Schwangerschaftswoche
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug	SR	Sinusrhythmus
NNR	Nebennierenrinde	SV	Schlagvolumen
NNRI	Nebennierenrindeninsuffizienz	SVES	supraventrikuläre Extrasystole
NPPV	noninvasive positive pressure ventilation	syn.	synonym
NSAR	nichtsteroidale Antirheumatika	Syndr.	Syndrom
		sys.	systolisch
oberfl.	oberflächlich	TEE	transösophageale Echokardiographie
od.	oder	Ther.	Therapie
Op.	Operation	TIVA	totale intravenöse Anästhesie
op.	operativ	TMD	Tagesmaximaldosis
		tox.	toxisch
p _a CO ₂	arterieller Kohlendioxidpartialdruck	Urs.	Ursache, Ätiologie
PA-Katheter	Pulmonalkatheter	UAW	unerwünschte Arzneimittelwirkung, Nebenwirkung
p _a O ₂	arterieller Sauerstoffpartialdruck		
pCO ₂ ET	endtidales CO ₂	v. a.	vor allem
Pat.	Patient, Patienten	VES _{mono}	ventrikuläre Extrasystole (monotop)
PCWP	pulmonalkapillärer Verschlussdruck (pulmonary capillary wedge pressure)	VES _{poly}	ventrikuläre Extrasystole (polytop)
PEEP	positiver endexpiratorischer Druck (positive endexpiratory pressure)	VF	Kammerflimmern, ventrikuläre Fibrillation, ventricular fibrillation
PEEPi	intrinsischer PEEP (okkult positiver endexpiratorischer Druck)	Vit.	Vitamine
PG	Prostaglandin	vKOF	verbrannte Körperoberfläche
PNS	peripheres Nervensystem	VT	Kammerflattern, ventrikuläres Flattern, ventricular flutter; ventrikuläre Tachykardie
PEA	pulslose elektrische Aktivität		
Quick	Thromboplastinzeit	WS	Wirbelsäule
re.	rechte	WW	Wechselwirkung
respirat.	respiratorische	ZNS	zentrales Nervensystem
rezidiv.	rezidivierend	ZVD	zentraler Venendruck
RL	Raumluft	ZVK	zentraler Venenkatheter
Rö.	Röntgen, Röntgenaufnahme	zw.	zwischen

1 Elementare Vitalfunktionen – Notfall, Notsituation

W. Dick

Notfälle sind Krankheiten od. Verletzungen, die das Leben bedrohen od. schwere gesundheitliche Schäden befürchten lassen, wenn nicht umgehend medizinische Hilfe geleistet wird.

Notsituationen sind isolierte Organfunktionsstörungen ohne aktuelle Lebensgefahr, die subjektiv bedrohlichen Charakter annehmen (Darm-, Nieren-, Gallensteinkolik) u. unabhängig davon in lebensbedrohliche Zweitsyndr. münden können (→ vasovagale Synkope, septischer Schock).

Die 3 **Vitalfunktionen 1. Ordnung** (syn. *elementare* od. *allgemeine Vitalfunktionen*) sind: **1. Atmung, 2. Herz-Kreislauf-, 3. Hirnfunktion.**

Vitalfunktionen 2. Ordnung stehen am Ende od. Anfang einer Schädigungskette, z. B. Wärme-, Wasser-Elektrolyt-, Säure-Basen-Haushalt, Nieren-, Leber-, Nebennierendysfunktion. Die Lebensbedrohung ist abhängig von Schwere u. Dauer der Funktionsstörung u. entwickelt sich langsam (Abb. 1-1).

Störungen des Wasser-Elektrolyt- od. Säure-Basen-Haushaltes vermögen lebensbedrohliche Entgleisungen heraufzubeschwören (Azidose, Alkalose, Hyper-, Hypokaliämie), sind i. d. R. jedoch Folgen von

- Störungen der Atem-, Herz-Kreislauf-, Nieren- u. regulatorischen Hirnfunktionen od. sind
- exogen bedingt → zu hohe Kaliumzufuhr, falsche Puffertherapie.

Am Ende der Schädigungskette stehen immer wieder Atem- u. Herz-Kreislauf-Funktion.

Die Vitalfunktionen 1. u. 2. Ordnung sichern gleichermaßen die Lebensvorgänge des Organismus. Ein Unterschied besteht jedoch in der Akuität bzw. dem Verlorengehen der Sicherung.

Abb. 1-1: Verbundsystem der Vitalfunktionen 1. und 2. Ordnung (WELH: Wasser-Elektrolyt-Haushalt; SBH: Säure-Basen-Haushalt)

Im System der Vitalfunktionen 1. Ordnung schafft die Lunge das Betriebsmittel Sauerstoff heran u. stellt es dem Transportmedium Blut zur Verfügung. Durch die Pumpfunktion des Herzens wird dieses Transportmedium u. damit das Betriebsmittel über Aufzweigungen im Gefäßsystem den Organen nach dem Verbrauch zudiktiert. Verbraucher ist das Gewebe der Organsysteme. Umgekehrt fällt am venösen Schenkel des Herz-Kreislauf-Systems all das an, was im Stoffwechsel nicht mehr verwertbar ist. Das gleiche Transportsystem eliminiert Stoffwechselprodukte auf pulmonalem, renalem, hepatischem Wege. Lösungsmittel ist Körperwasser od. Blut.

Störung der Vitalfunktionen

Zu unterscheiden sind fehlende *Funktionsbedingungen* u. *-fähigkeit* der Organsysteme.

Fehlende Funktionsbedingung:

- Atemfunktion → kein Sauerstoff
- Herz-Kreislauf-Funktion → Einschränkung von Blut u. Körperflüssigkeit
- Hirnfunktion → beide Betriebsmittel sind von gleichrangiger Bedeutung

Fehlende Funktionsfähigkeit: Organschädigung selbst. *Beispiele:*

- Herz-Kreislauf-Funktion → Herzinfarkt, Gefäßverletzung.
- Atemfunktion → massive Lungenblutung, Obstruktion in den zuführenden Luftwegen.
- Hirnfunktion → Entzündung, Verletzung, Infarkt.

Fehlende *Funktionsbedingungen* u. *Funktionsfähigkeit* führen gleichermaßen zur akuten Lebensbedrohung, im Extremfall zu *klinischem* u. *biologischem Tod*.

Der **klinische Tod** ist durch ein reversibles Sistieren von Atem-, Herz-Kreislauf- u. Hirnfunktion gekennzeichnet, wobei eine Grenze von ca. 5 min den klinischen Tod vom biologischen trennt.
Der **biologische Tod** ist durch irreversible Schädigungen aller Organsysteme charakterisiert.

Die genannte Frist zw. klinischem od. biologischem Tod ist die Regel. Ausnahmen mit z. T. erheblich längeren Intervallen sind: Beinaheertrinken, Unterkühlung, Lawinenverschüttung, einige Intoxikationen.

1.1 Untersuchung auf vitale Funktionsstörungen

Untersuchung des Notfallpatienten. Die klinische Untersuchung ist kurz u. konzentriert sich darauf, Vitalfunktionsstörungen zu diagnostizieren (Tab. 1-1). Lange Untersuchungszeiten konkurrieren mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen!

- Alarmsymptome zeigen akute Vitalfunktionsstörungen an
- *Warnsymptome* weisen auf drohende Störungen der Vitalfunktionen hin, eine manifeste Störung liegt nicht vor.
- *Begleitsymptome* sind unspezifische Zeichen, die keine Aussage als Leitsymptome haben, die u. U. eine weitere Differenzierung erlauben.
- *Leitsymptome* sind Alarm- u. Warnsymptome zusammen u. entscheiden die Notfalldiagnose.

Untersuchungsziel

- Schäden abwenden
- Behandlungsbeginn nicht verzögern.

Untersuchungsgang

Vor dem Eintreffen am Notfallort

- Was besagt die Notfallmeldung?
- Was erfährt man von Angehörigen, Umstehenden?
- Was sieht man am Notfallort?

Beim Eintreffen am Notfallort

- Was wird in welcher Reihenfolge untersucht?

- Was hat Bedeutung für die Notfalltherapie?
- Haben die Notfallmaßnahmen Bedeutung für die Korrektur der Notfalldiagnose?

Anamnese

- Spontanäußerung des Patienten
- Eigenanamnese (wenn der Pat. bei Bewußtsein ist)
- Fremd- bzw. Umgebungsanamnese.

Klinische Untersuchung

- Inspektion u. Palpation
- Auskultation u. Perkussion
Ggf. Zusatzuntersuchungen (technische, z. B. EKG, laborchemische, z. B. Blutzucker).

Die orientierende Untersuchung der Vitalfunktionen 1. Ordnung hat Priorität u. ist in wenigen Augenblicken in dieser Reihenfolge durchzuführen:

1. Hirnfunktion
2. Atmung
3. Herz-Kreislauf-Funktion.

Apparative u. laborchemische Untersuchungen am Notfallort sind auf 6 *Zusatzuntersuchungen* beschränkt:

1. EKG, 2. SaO₂, 3. EtCO₂, 4. Blutdruck,
5. Blutglukose- 6. Acetonbestimmung mit Teststreifen, 7. ggf. Inhalationsnachweis mit Sets bei exogener Intox.

Tab. 1-1: Mainz Emergency Evaluation Score (MEES): Vitalparameter, Bewertungsstufen, Wertegrenzen

Vitalparameter	Bewertungsstufe	Wertegrenze
GCS	4	15
	3	14–12
	2	11–8
	1	≤ 7
Herzfrequenz	4	60–100
	3	50–59
	2	40–49
	1	≤ 39
Atemfrequenz	4	12–18
	3	8–11
	2	5–7
	1	≤ 4
Herzrhythmus	4	SR
	3	SVES, VES _{mono}
	2	ABSARRH, VES _{poly}
	1	VT, VF, ASY
Schmerz	4	kein Schmerz
	3	leichter Schmerz
	2	starker Schmerz
	1	entfällt
Blutdruck	4	120/80–140/90
	3	100/70–119/79
	2	80/60–99/69
	1	≤ 79/59
SaO ₂	4	100–96
	3	95–91
	2	90–86
	1	≤ 85

MEES-Wert:

1.1.1 Hirnfunktion

Bewußtseinslage. Die orientierende Untersuchung konzentriert sich auf die Beurteilung des *Bewußtseins*. Man unterscheidet 4 *Bewußtseinsstadien*:

1. *Bewußtseinsklarheit* bedeutet

- Orientierung hinsichtlich *Raum, Ort, Zeit*
- kein ständiges Einschlafen
- Aufmerksamkeit* wird nicht von außen erregt.

2. *Somnolenz* (leichte Form der quantitativen Bewußtseinsstörung). Schläfriger Zustand, weckbar durch äußere Reize.

- Augen werden nach Aufforderung geöffnet, wieder geschlossen, sobald Reiz entfällt.

b) Neurologische Veränderungen können vorhanden sein, spielen für die Notfalldiagnose keine Rolle.

3. *Sopor* (mittlere Form der quantitativen Bewußtseinsstörung). Schlafähnlicher Zustand, durch äußere Reize nicht mehr voll erweckbar; nur stärkste Stimuli (z. B. Schmerzreize) können Reaktionen (z. B. Abwehrbewegung) auslösen.

- Kurzzeitiges Öffnen der Augen nach einem Reiz.

4. *Koma* (schwerster Grad der quantitativen Bewußtseinsstörung). Nicht erweckbar durch äußere Reize.

- Keine Spontanaktivität, Augen werden auf Anruf nicht geöffnet.

- Neurologische Symptome können vorhanden sein. Komaeinteilung nach GCS (s. Kap. 5.1.1, S. 177).

Leitsymptome (= Alarm- + Warnsymptome) bestimmen den weiteren Untersuchungsgang (s. Kap. 5.1.1).

Wiederum ist in *Alarm-* u. *Warnsymptome* zu differenzieren bzw. in (unspezifische) *Begleitsymptome*, die in ihrer Wertigkeit nicht zu überschätzen sind u. bei vielen Notfällen vorkommen.

Alarmsymptome erfordern ein sofortiges Handeln:

- Koma, Schock, Atem- od. HKS.

Warnsymptome verlangen Aufmerksamkeit:

- Blutung, Frakturen, Krämpfe, Lähmungen.

Begleitsymptome werden registriert (können in Warn- od. Alarmzeichen übergehen):

- Exantheme, Foetor ex ore (Alkohol).

Untersuchung (s. Kap. 5.1.1)

Anamnese: Verletzung, Krankheit, Medikation, Umgang mit Chemikalien, Kopfschmerz, Erbrechen, Lähmung, Krampf.

Inspektion: Haut → Farbe, Turgor, Temperatur, Blasen, Exanthem; Geruch, Krämpfe, Lähmung, Struma.

Palpation, Puls, Haut, Pupillen, Bulbi, Lungen:

Perkussion: Dämpfung, KS-Differenz.

Auskultation: Herz → Frequenz, Rhythmus, Töne, Geräusche.

Lungen → Atemgeräusch.

Kreislauf → Blutdruck, -amplitude.

Zusatzuntersuchung: Atem-, Herz-Kreislauf-Funktion: EKG; Reflexe, Bulbi, Pupillen, Meningismus; Glukose-, Acetonbestimmung.

Störung der Hirnfunktion

Ausfall der *Funktionsbedingungen*: Meist durch Störungen der beiden anderen Vitalfunktionen 1. Ordnung: Hypoxämie, Hypo- od. Hyperglykämie, endo- u. exogene Toxinzufuhr, Volumenmangel.

Ein Ausfall der Hirnfunktion selbst ereignet sich z. B. auf der Basis einer Blutung, eines Infarktes, ischämischer Prozesse, von Tumoren u. von Verletzungen.

1.1.2 Atemfunktion

Die **orientierende Untersuchung** klärt, ob die Atmung *stabil/instabil* ist:

- regelmäßig
- gleichmäßig
- ohne äußerliche Behinderung erfolgt.

Bei 3 positiven Antworten scheidet eine primäre Atemfunktionsstörung aus.

Anamnese: Husten, Auswurf, Hämoptoe, Dyspnoe, Stridor; Fieber, Schmerz; Medikation

Inspektion: Atemexkursion, Atemtyp, Hautfarbe (Zyanose), Dyspnoe, Stridor, Nagelbettdurchblutung, Pupillen, Venenstauung

Palpation, Seitendifferente Atemexkursion,

Perkussion: Dämpfung, KS-Differenz

Auskultation: Herz → Frequenz, Rhythmus, Töne, Geräusche

Lungen → Atem-, Nebengeräusch

Kreislauf → Blutdruck, -amplitude

Zusatzuntersuchung: Bewußtsein, Herz-Kreislauf-Funktion: EKG, Glukose, Aceton

Alarmsymptome (abruptes Umschlagen in Apnoe od. Schnappatmung möglich) erfordern das sofortige Handeln:

- pathologische Atmungstypen (Abb. 1-2, s. Kap. 5.1.1), massive Dyspnoe.

Abb. 1-2: Pathologische Atmungstypen. Die Exkursionen der spirometrischen Kurven sind der Atemtiefe proportional (s. Abb. 5-1, S. 178)

NOTARZTEINSATZPROTOKOLL Empfehlung der DIVI 98

Version 4.0

AOK	LKK	BKK	IKK	VdAK	AEV	Knappschaft	UV
Name, Vorname des Versicherten _____ geb. am _____							
Kassen-Nr. _____		Versicherungs-Nr. _____		Status _____			
Vertragsarzt-Nr. _____		VK gültig bis _____		Datum _____			
Geschlecht ☐ m ☐ w		Geburtsjahr _____		-monat _____			
		☐ unbekannt					
Standort _____				Rettungsmittel ☐ NEF ☐ NAW ☐ RTH ☐ ITH		Einsatznummer ☐ ITW ☐ RTW ☐ KTW	
1. Rettungstechnische Daten							
Einsatzdatum: _____				Alarm: _____		Ankunft: _____	
Einsatzort: _____				Abfahrt: _____		Übergabe: _____	
Transportziel: _____				Einsatzbereit: _____		Ende: _____	
Rettungs-Ass.: _____				Notarzt: _____		km (gesamt): _____	
☐ Fehlfahrt (Einsatzabbruch/kein Patient)							

2. Notfallgeschehen / Anamnese / Erstbefund (Beschwerdebeginn, Unfallzeitpunkt, Vormedikation, Vorbehandlung)

3. Erstbefund	Zeitpunkt _____	Bewußtseinslage ☐ narkotisiert/sediert ☐ orientiert ☐ getrübt ☐ bewußtlos
3.1. Neurologie unauffällig ☐		
Glasgow-Coma-Scale		
Augen öffnen spontan 4 auf Aufforderung 3 auf Schmerzreiz 2 kein 1	beste verbale Reaktion konversationsfähig 5 orientiert 4 desorientiert 3 inadäquate Äußerung (Wortsalat) 2 unverständliche Laute 1 keine 1	Extremitätenbewegung normal 3 leicht vermindert 2 stark vermindert 1
beste motor. Reaktion auf Aufforderung 6 auf Schmerzreiz 5 gezielt 4 normale Beugeabwehr 3 abnorme Abwehr 2 Strecksynergismen 1 keine 1	Pupillenweite eng mittel weit entrundet nicht beurteilbar	Keine Lichtreaktion ☐ ☐ Meningismus ☐ ☐
Summe _____		
3.2. Meßwerte		
RR _____ / _____ HF _____ Temp. _____ BZ _____ Atemfrequenz _____ SpO ₂ _____ et CO ₂ _____ Schmerz: ☐ kein ☐ leicht ☐ stark ☐ entfällt		
3.3. EKG ☐ keine		
☐ Sinusrhythmus ☐ schmale QRS-Tachykardie ☐ absolute Arrhythmie ☐ breite QRS-Tachykardie ☐ AV-Block II° Typ Wenckebach ☐ Kammerflattern/-flimmern ☐ AV-Block II° Typ Mobitz ☐ elektromechanische Dissoziation ☐ AV-Block III° ☐ Asystolie ☐ Schrittmacherrhythmus		
Extrasystolen ☐ SVES ☐ monomorph ☐ polymorph ☐ VES		
3.4. Atmung ☐ nicht untersucht		
☐ unauffällig ☐ Rasselgeräusche ☐ Apnoe ☐ Dyspnoe ☐ Stridor ☐ Beatmung/Tubus ☐ Zyanose ☐ Atemwegverlegung ☐ Spastik ☐ Schnappatmung		

4. Erstdiagnose	4.2. Verletzungen
4.1. Erkrankung ☐ keine	☐ keine ☐ leicht ☐ mittel ☐ schwer
ZNS: ☐ TIA / Insult / intracraniale Blutung ☐ Krampf ☐ _____ Herz-Kreislauf: ☐ Angina Pectoris ☐ Herzinfarkt ☐ Rhythmusstörung ☐ Lungenembolie ☐ Lungenödem ☐ hypertensiver Notfall ☐ Orthostase ☐ _____ Atmung: ☐ Asthma ☐ Aspiration ☐ Pneumonie/Bronchitis ☐ Hyperventilations-Tetanie ☐ _____ Abdomen: ☐ akutes Abdomen ☐ gastrointestinale Blutung ☐ Kolik ☐ _____	Schädel-Hirn ☐ ☐ ☐ ☐ Gesicht ☐ ☐ ☐ ☐ Thorax ☐ ☐ ☐ ☐ Abdomen ☐ ☐ ☐ ☐ Wirbelsäule ☐ ☐ ☐ ☐ Becken ☐ ☐ ☐ ☐ Obere Extremitäten ☐ ☐ ☐ ☐ Untere Extremitäten ☐ ☐ ☐ ☐ Weichteile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Verbrennung/Verbrühung ☐ Unfallmechanismus Grades _____ % Trauma: stumpf ☐ penetrierend ☐ Grades _____ % Sturz > 3 m Höhe ☐ ☐ Inhalationstrauma ☐ Verkehr: Fußgänger angefahren ☐ ☐ Elektroofall ☐ PKW/LKW-Insasse ☐ ☐ andere ☐ Zweiradfahrer ☐ sonst. ☐
Psychiatrie: ☐ Psychose / Depression / Manie ☐ Erregungszustand ☐ Intoxikation ☐ Alkohol / Drogen / Medikamente ☐ Entzug ☐ Alkohol / Drogen / Medikamente ☐ Suizidversuch ☐ _____ Stoffwechsel: ☐ Hypoglykämie ☐ _____ Pädiatrie: ☐ Fieberkrampf ☐ Pseudokrupp ☐ SIDS ☐ _____ Gynäkologie/Geburtshilfe: ☐ Geburt ☐ vaginale Blutung ☐ _____ Sonstiges: ☐ anaphylakt. Reaktion ☐ Unterkühlung ☐ Ertrinken ☐ sonstige Intoxikation ☐ _____	
Erstdiagnose _____ _____ _____	
ICD 1 _____ ICD 2 _____ ICD 3 _____	

- inverse u. paradoxe Atmung, Schnappatmung u. Atemstillstand (Apnoe), massive Hämoptoe, Schock.

Inverse Atmung: umgekehrte Atmung; bei Atemwegobstruktion durch Fremdkörper, Schwellung od. Laryngospasmus kommt es durch max. Zwerchfellekkursion zur passiven Thoraxbewegung: Vorwölbung des Abdomens u. Senkung des Thorax während der versuchten Einatmung bzw. Einziehen u. Hebung während der versuchten Ausatmung, ohne daß eine Ventilation stattfindet (→ *funktionseller Atemstillstand*);

Sympt.: Zyanose, fehlendes Atemgeräusch, max. Atemexkursion.

Paradoxe Atmung: inspiratorische Einwärts- u. expiratorische Auswärtsbewegung eines pathologisch beweglichen Thoraxwandanteils (→ paradoxe Atembewegung, Brustwandflattern), z. B. bei Rippenserienfraktur; führt zu Pendelluft u. damit zu respirat. Insuffizienz.

Warnsymptome verlangen Aufmerksamkeit:

- Zyanose od. Dyspnoe
- Stridor (an der Grenze zw. Warn- u. Alarmsymptom). Er kann z. B. bei einer beginnenden Epiglottitis therapeutisch beeinflussbar sein, bei einem Verbrennungsoffer jedoch bereits Alarm auslösen.
- Thoraxschmerz, Zyanose, Orthopnoe, Hypo-/Hyperpnoe, Hautemphysem, fehlendes Atemgeräusch, Klopfeschall-Differenz, Atemtyp u. Atemgeräusch pathologisch.

Begleitsymptome werden registriert (können in Warn- od. Alarmsymptomen übergehen):

- Unruhe, Angst, Bewußtseinsstörung.

Störung der Atemfunktion

Die Sauerstoffreserven reichen nur wenige Min. (Tab. 1-2). *Sauerstoffmangel* mündet rasch in eine Störung der Vitalfunktionen 1. Ordnung.

Sauerstoffmangel → Hypoxygenation des Blutes → Hypoxämie → Hypoxie der Gewebe. Der mangelhafte Abtransport von CO₂ führt seinerseits zu einer *Hyperkapnie*.

Hyperkapnie (s. Kap. 3).

1. Veränderung der Funktionsbedingung

a) Zusammensetzung der Atemluft

- *Sauerstoffarme Luft.* In großen Höhen nimmt der Anteil von Luftsauerstoff ab.

Tab. 1-2: Sauerstoffspeicherkapazität unter Luft- u. reiner O₂-Atmung

O ₂ -Speicher	Luftatmung (ml)	100%ige O ₂ -Atmung (ml)
Lungen	450	3 000
Blut	850	950
Gewebeflüssigkeit	50	100
Myoglobin	200	200
Summe	1 550	4 250

- *Kohlenmonoxidintoxikation.* CO hat eine um den Faktor 400 höhere Affinität zu Hb → O₂ wird kompetitiv verdrängt → Hypoxie.
 - *Verminderte Sauerstoffkonzentration.* Ertrinkungsunfall, Verschüttung, Erstikung, Aufenthalt in großen Höhen. Hierbei tritt zusätzlich die CO₂-Akkumulation in Erscheinung.
- b) *Zentrale Atemregulationsstörung.* Schädigungen des Atemzentrums resultieren in Hypo-, Hyperventilation, pathologische Atemungstypen (s. Abb. 1-2). *Urs.:*
- SHT, Medikament, Gift, entzündliche Krankheit, Durchblutungsstörung, Unterkühlung od. Überwärmung, Blutung.
- c) *Obstruktion* (s. Kap. 3.3.2, S. 71). Eine partielle od. totale Verlegung der Atemwege führt zur Hypo-, u. Dysventilation. *Urs.:*
- zurückfallende Zunge, Fremdkörper, Bolus, Aspirat, Schleimhautschwellung, reflektorischer Spasmus → Insektenstich, Larynxödem, Diphtherie, Pseudokrapp, Verbrennung, Ertrinken.
- d) *Kompression der Lunge* mündet in eine Hypoventilation. *Urs.:*
- *Verletzung* → Thoraxtrauma, -instabilität, Pneumo-, Hämatothorax, Pleuraerguß, Zwerchfellverletzung.
 - *Neuromuskuläre Funktionsstörung* → Querschnittsverletzung oberhalb von C4, früher Poliomyelitis u. Tetanus, Ausfall des N. phrenicus, entzündliche

Krankheit (Meningoenzephalitis) u. Lähmung.

e) Partielle od. totale Embolie

2. Änderung od. Verlust der Organfunktion.
Urs.:

- Lungentrauma u. Aspirationsfolge
- Ödem, Atelektase
- Lungenentzündung, Asthma bronchiale → Bronchial- u. Pulmonalfunktion sind gestört
- Strukturelle Veränderung → Emphysem, Kontusion.

Charakteristisch für direkte Funktionseinbußen sind:

- ungleiche Verteilung der Sauerstoffmenge auf die Lungenareale.
- Unterschiedliche Diffusionsbedingung an der Grenze zwischen Lungen- u. Gefäßstrukturen. Wenn man bedenkt, daß zwischen Alveolar- u. Gefäßlumen mehrere Strukturen (s. Abb. 8-4, S. 283) angesiedelt sind, wird die Häufigkeit von Störmöglichkeiten an dieser Stelle besonders evident.

Der Netto-Effekt ist stets ein Diffusionsverlust für Sauerstoff; die Diffusionseinschränkung für CO₂ hingegen ist etwa 25 × geringer als die für Sauerstoff. Hypoxygenation tritt früher ein als Hyperkapnie.

1.1.3 Herz-Kreislauf-Funktion

Die **orientierende Untersuchung** (s. Tab. 1-1) stellt fest, ob die Herz-Kreislauf-Funktion *stabillinstabil* ist:

- regelmäßiger Puls
- gut gefüllter Puls
- normale (60–100/min) Pulsfrequenz
- keine exzessive Blutdrucksteigerung (> 200 Torr systol.) od. kein extremer Abfall (< 60 Torr).

Anamnese: Thorax-, Extremitäten-, Kopfschmerz (Dauer, Ausstrahlung), Dyspnoe, Synkope, Parästhesie, Herzrhythmusstörung, Medikation.

Inspektion: Atmung, Haut, Nagelbettdurchblutung, Halsvenen, periphere Nerven, Ödem, Pupillen, Extremitätenbesonderheit, Venenstauung.

Palpation: Puls (Radialis, Fußpulse, Karotis).

Perkussion: -frequenz, -qualität; Rhythmus.

Auskultation: Herz: Frequenz, Rhythmus, Töne, Geräusche.

Lungen: RG.

Zusatzuntersuchung: Kreislauf: EKG, Blutdruck. Bewußtsein, Atmung.

Alarmsymptome erfordern ein sofortiges Handeln:

- *HKS*
- *Akute Herzinsuffizienz* → Dyspnoe, Venenstauung, Ödem, Lungenstauung, -ödem
- *Schock*. Eingeschränkte Bewußtseinslage, fahle Hautfarbe bei kaltschweißiger Haut, kaum wahrnehmbarer fadenförmiger tachykarder Puls, extrem niedriger Blutdruck, z. B. 60/40 mmHg.

Warnsymptome verlangen Aufmerksamkeit:

- Rhythmusstörung (Tachy-, Bradykardie), bei einer plötzlichen absoluten Arrhythmie auch bereits Alarmsymptom. Die orientierende Untersuchung beschränkt sich auf die Palpation.

Die EKG-Diagnostik ist Gegenstand einer späteren Phase der außerklinischen Notfalluntersuchung.

- Thoraxschmerz, Zyanose, Dyspnoe, Venenstauung, Krampf, respirat. Warnsymptome.

Begleitsymptome werden registriert (können in Warn- od. Alarmzeichen übergehen):

- Unruhe, Angst, Übelkeit, Bewußtseinsstörung, zerebraler Krampf, Ödeme, Thrombose, Strommarke.

Besteht keine Lebensgefahr mehr, so ist die orientierende Erstuntersuchung zu vervollständigen.

Störung der Herzfunktion

1. Einschränkung der Funktionsbedingungen

- Volumenmangel jeder Ursache
- Funktionseinschränkung von außen: Perikarditis, -erguß, Hämoperikard, Herzbeutelamponade, Panzerherz; Thoraxtrauma mit Mediastinalflattern.

2. Einschränkung der Funktionsfähigkeit sind beim Herzen bedeutsamer als die beeinträchtigten Funktionsbedingungen.

- Myokardinfarkt, Myokarditis
- Toxine
- Rhythmusstörung (Urs.: Infarkt, Toxine, Störung der Kalium- u. Säure-Basen-Homöostase) → Brady- u. Tachykardien, Vorhofflimmern u. -flattern, Kammerflimmern, -flattern.

1.1.4 Wasser-Elektrolyt-Haushalt

Untersuchung:

Anamnese: Alter, Stoffwechselkrankheit, Fieber, Durchfall, Kopfschmerz, zerebraler Krampf, Koma, Erbrechen, Schwäche, Medikation.

Inspektion: Zunge, Haut/Schleimhäute, Atmung, Tetanie.

Palpation, Perkussion: Hautfalten, -temperatur, Pulsfrequenz, -qualität, Rhythmus, Klopf-schalldämpfung.

Auskultation: Herz → Frequenz, Rhythmus, Töne, Geräusche.
Lungen → RG.

Zusatzuntersuchung: Kreislauf → Blutdruck, -amplitude. Bewußtsein, Herz-Kreislauf-, (EKG) Atemfunktion, Reflexe, Bulbi, Pupillen, Glukose, Aceton.

Alarmsymptome erfordern ein sofortiges Handeln:

- Koma, zerebraler Krampf, Schock.

Warnsymptome verlangen Aufmerksamkeit:

- Apathie, Erbrechen, Tachykardie, Arrhythmie, patholog. Atmungstyp, Reflexe.

Begleitsymptome werden registriert (können in Warn- od. Alarmzeichen übergehen):

- trockener Husten, Schleimhäute, Zunge, Fieber, Durst, Übelkeit/Erbrechen.

1.1.5 Pathophysiologische Verknüpfung

Coma diabeticum, hypoglykämischer Schock (Abb. 1-3): Am Anfang steht die Stoffwechselstörung → nicht eliminierbare Stoffwechselpro-

Abb. 1-3: Synkope. Diagnostischer Stellenwert der Soforttherapie

dukte → Hirnfunktion ↓ (Bewußtseinsverlust, Beeinträchtigung des Atemzentrums) → sek. Schädigung der Atemfunktion (→ Kussmaul-Atmung).

Die **Hypoventilation** – am Beginn einer Schadenskette stehend – führt schnell zu Hypoxie u. Hyperkapnie → Hirnfunktion ↓ (bis zum Bewußtseinsverlust), hypoxämische Schädigung lebenswichtiger Zentren → Herzinsuffizienz od. HKS.

Primäre Störungen der Herzfunktion, z. B. gravierende Rhythmusstörungen (s. Kap. 4.6.4), führen über eine Unterbrechung der Hirnzirkulation zu Bewußtseinseinschränkung, -verlust, Schädigung lebenswichtiger Hirnfunktionen u. schließlich zu Veränderung der Atemfunktion (s. Abb. 1-2).

Daß in dieses Geflecht pathophysiologischer Mechanismen der Vitalfunktionen 1. Ordnung solche der Vitalfunktionen 2. Ordnung hineinreichen, zeigt das Beispiel des Diabetes mellitus.

Ähnliche Beispiele (s. Kap. 5.2.2): Leberausfallkoma, Hyper- od. Hypothyreose, Hypo- od. Hyperfunktion von weiteren endokrinen Drüsen (Nebenniere, Hypophyse).

2 Akute Störungen der Vitalfunktionen, Behandlungsprinzipien

2.1 Rettung, Bergung, Lagerung

J. Brachlow, T. Schneider

Rettung. Ist durch Verletzungen od. Bewußtlosigkeit ein Befreien aus einer Gefahr nicht möglich, wird gerettet → *gerettet werden Lebende!*

Bergung. Einbringen von leblosen Menschen → *geborgen werden Tote!*

Rettungsgrundsätze

1. Überblick über die allgemeine Notfallsituation schaffen!
2. Sind die eigenen Mittel ausreichend, ist weitere Hilfe erforderlich?
3. Besteht Eigengefährdung?
4. Bestehen zusätzliche Gefahren für den Verletzten?
5. Stromunfälle: bis 1 000 V Stromkreis unterbrechen, isolierter Standort; > 1 000 V VDE-Fachmann über Feuerwehr nachfordern!
6. Überprüfung u. Sicherung der Vitalfunktionen!
7. Rettungstechnik anwenden!

Nachalarmierung der Feuerwehr ist erforderlich bei eingeklemmten Personen u. bei Eigen- od. Fremdgefährdung:

- Brandgefahr u. Stromunfällen, insbesondere > 1 000 V
- Gasverseuchten Räumen u. bei Einsturzgefahr.

Nachalarmierung der Polizei bei

- Arbeits- u. Verkehrsunfällen mit Todesfolge
- Kriminellen Handlungen
- Unklarer Todesursache
- Ab- u. Beweissicherung.

In vielen Fällen ist bei eingeklemmten Personen ein Zugang zu Kopf, Thorax u. einer Ex-

tremität möglich, so daß die Vitalfunktionen → (Bewußtsein, Atmung, Herz-Kreislauf-Funktion → Blutdruck, EKG) kontinuierlich überwacht werden können u. ein Venenzugang gewährleistet ist.

2.1.1 Rettungsgriffe, Helmabnahme

Durchführung von Rettungsmaßnahmen eines in Not Geratenen (→ Hilfe im Notfall) sind gesetzliche Pflicht (§ 323 c StGB).

Rettungsgriffe

Rettungsgriffe dienen dem Hauptziel, Verletzte aus der Gefahrenzone zu entfernen. Dazu werden folgende Techniken angewendet:

Rautek-Rettungsgriff. Handgriff zur Rettung hilfloser Personen aus Gefahrenzonen. Anzuwenden ist er bei sitzenden, liegenden, bewegungsunfähigen, bewußtlosen Verletzten (Abb. 2-1 bis 2-5).

- *Cave:* drohende WS-Luxationsfraktur, insbesondere der HWS → bei *Bewußtlosen* wenig beugen od. drehen – der Tonus der schützenden Rückenmuskeln ist ausgefallen!

Durchführung: Der Helfer steht mit leicht gespreizten Beinen am Kopf des auf dem Rücken Liegenden (Abb. 2-1).

Er beugt sich zum Verletzten herunter, umgreift Nacken u. Hinterkopf u. richtet ihn in eine sitzende Position auf (*cave* HWS). Anschließend gleiten die Hände zur Stabilisierung auf die Schulterregion (Abb. 2-2).

Abb. 2-1: Rautek-Rettungsgriff 1. Schritt

Abb. 2-3: Rautek-Rettungsgriff 3. Schritt

Abb. 2-2: Rautek-Rettungsgriff 2. Schritt

Abb. 2-4: Rautek-Rettungsgriff 4. Schritt

Der Helfer schiebt beide Arme unter die Achselhöhlen u. umfaßt dessen quergelegten Unterarm derart, daß beide Hände parallel am Arm angreifen (Abb. 2-3). Abschließend richtet er sich auf, zieht den Verletzten auf die Oberschenkel u. bringt ihn rückwärts schreitend aus der Gefahrenzone (Abb. 2-4).

Rautek-Rettungsgriff (→ Rettung aus Fahrzeugen). Der Helfer tritt nahe an den Sitzenden heran. Er vergewissert sich, daß die Beine nicht zw. den Pedalen eingeklemmt, Thorax u. Abdomen durch Lenkrad od. Armaturenbrett nicht eingeengt u. die Arme frei zugänglich sind.

Durchführung: Der Helfer umgreift die Hüften u. zieht den Verletzten an der Beklei-

Abb. 2-5 a, b: Rautek-Rettungsgriff zur Rettung aus Fahrzeugen

dung so weit heraus, daß der Rücken frei wird. Anschließend werden beide Arme unter die Achselhöhlen geschoben u. der Verletzte am quergelegten Unterarm aus dem Fahrzeug gezogen (Abb. 2-5). Falls verfügbar kann ein 2. Helfer dafür Sorge tragen, daß eine Extremität nicht zwischen Türrahmen u. Sitz eingeklemmt ist. Außerdem kann er den Patienten an der Ferse od. den Hosenbeinen mittragen helfen.

Rückenschleiftrick nach Rautek. Zum Retten aus Röhren od. unter einem Fahrzeug bewegt sich der Helfer auf dem Rücken mit den Füßen voran in Richtung Kopf des Verletzten, bis dieser zw. den Beinen des Helfers liegt. Nun hebt man Kopf u. Schultern an u. schiebt sich möglichst weit unter ihn. Der Verletzte wird mit angewinkelten Oberschenkeln festgehalten, während der Helfer rückwärts ins Freie kriecht.

Helmabnahme

Bei bewußtlosen Zweiradfahrern muß der Helm entfernt werden.

Praxishinweis

- Helmabnahme zu zweit durchführen!
- Zuerst Visier anheben, ggf. Brille entfernen!

Abb. 2-6

Abb. 2-7

- 1 Helfer kniet am Kopf u. hält Helm u. Unterkiefer mit beiden Händen fest (Abb. 2-6).
- Der 2. Helfer kniet neben dem Verletzten u. öffnet den Kinnriemen. Dabei führt der am Kopf Kniende eine geringe HWS-Extension aus u. hält den Kopf in beiden Kiefergelenken gestreckt (Abb. 2-7).

Abb. 2-9

Abb. 2-6 bis 2-9: *Helmabnahme*. Mit 2 Helfern wird unter Immobilisation der HWS der Helm abgenommen u. in steifer Halskrause immobilisiert

- Der 1. Helfer kippt den Helm leicht nach hinten u. zieht ihn nach oben. Er hält den Kopf gestreckt (Abb. 2-8), bis zur endgültigen Immobilisation der HWS durch eine steife Halskrause, z. B. Stif-Neck® (Abb. 2-9) u. Lagerung auf einer Vakuummatratze.

2.1.2 Lagerung

Die **Lagerung** dient dem Hauptziel, Schmerzen zu vermeiden. Sie wird von Krankheit, Verletzung, Bewußtseinslage u. Herz-Kreislauf-Funktion bestimmt.

Primäre Lagerungstechnik (ohne erweiterte Maßnahmen) findet Anwendung bei:

1. Störung der elementaren Vitalfunktionen: Bewußtsein, Atmung, Herz-Kreislauf
2. Gynäkologisch-geburtshilflicher Notfall
3. Spezielle Verletzung.

2.1.2.1 Störung elementarer Vitalfunktionen

Bewußtseinsstörung

Stabile Seitenlage. Bei Bewußtlosen kann die zurückgesunkene Zunge die Atemwege verlegen. Der Mund wird zum tiefsten Punkt des Kopfes; Speichel, ggf. Blut fließen nach außen ab.

Indikation:

- Bewußtlose mit Spontanatmung (→ Intubation. Beatmung, Reanimation nicht erforderlich).

Abb. 2-10: *Seitenlage 1.* Ein Helfer steht auf der Seite, auf der der Patient gelagert werden soll. Die Hand wird unter das Gesäß gelagert, das Bein gebeugt

Abb. 2-11: Seitenlage 2. Der Patient wird auf die Seite gedreht

Abb. 2-12: Seitenlage 3. Der Kopf wird überstreckt, die freie Hand unterpolstert den Kopf

Durchführung: Der Helfer stellt sich neben den Bewußtlosen auf die Seite, auf die dieser gelegt werden soll, hebt diesen in Hüfthöhe an u. schiebt den gleichseitigen Arm unter das Gesäß, so daß der Geschädigte auf seiner Hand zu liegen kommt. Das gleichseitige Bein wird in Hüft- u. Kniegelenk gebeugt u. möglichst weit dem Gesäß genähert (Abb. 2-10). Danach faßt man Schulter u. Hüfte der Gegenseite u. zieht ihn zu sich hinüber (Abb. 2-11). Anschließend werden der Kopf im Nacken überstreckt u. die Hand unter das Kinn geschoben, um den Kopf zu fixieren. Der auf der Rückenseite liegende Arm wird leicht abgewinkelt u. verbessert damit die Stabilität der Seitenlage (Abb. 2-12, 13).

Kontraindikation: 1. Rückenlage bei bewußtlosen, nicht intubierten Patienten (→ drohende Aspiration!). 2. Kopftieflagerung bei (begleitendem) SHT.

Atmungsstörung

Dyspnoe (Atemnot). Halbsitzende od. sitzende Position erleichtern die Atmung bei erschwelter In- od. Expiration.

Abb. 2-13: Seitenlage 4. Komplette stabile Seitenlage

- **Oberkörperhochlagerung.** Bei leichter bis mittelschwerer Dyspnoe genügt oft eine Lagerung um 30–45° (s. Abb. 2-21). Durch die Schwerkraft werden Bauchinhalt u. Zwerchfell nach unten gezogen, der Brustkorb kann sich leichter ausweiten, die Zwerchfellbeweglichkeit wird verbessert (Abb. 2-14).

Abb. 2-14: Lagerung bei Atemnot

Abb. 2-15: Lagerung bei Lungenödem. Halbsitzend mit abhängigen Beinen für venöses pooling (sog. cardiac position)

Abb. 2-16: Lagerung bei Thoraxverletzungen. Oberkörperhochlagerung auf die verletzte Seite bei wachen, spontan atmenden Patienten

Lungenödem. Halbsitzende Lagerung mit herabhängenden Beinen bewirkt eine Drucksenkung im Lungenkreislauf u. reduziert die Vorlast des re. Herzens durch venöses Pooling (Abb. 2-15).

Rippenserienfraktur. Der spontan Atmende wird bei Oberkörperhochlagerung auf die verletzte Seite gelagert, wodurch Schmerzlinderung u. bessere Belüftung der unverletzten Seite erreicht wird (Abb. 2-16).

Praxishinweis: Bei Dyspnoe immer jene Lage bevorzugen, die (subjektiv) die größte Atem erleichterung verschafft.

Herz-Kreislauf-Störung

Herzinfarkt, kardiogener Schock. Oberkörperhochlagerung bei flacher Position der Beine vermindert den venösen Rückstrom zum insuffizienten Herzen.

- **Cave:** Drohende zerebrale Minderperfusion mit Bewußtlosigkeit durch erhöhte Oberkörperposition → kontinuierliche Überwachung erforderlich (Abb. 2-17).

Volumenmangelschock. 2 Lagerungen:

- Bei der *Ganzkörperschräglage* sind Vorlast, ZVD aber auch intraabdomineller u. -thorakaler Druck erhöht. Darüber hinaus besteht die Gefahr eines Hirnödems.

Abb. 2-17: Lagerung bei Herzinfarkt. Leicht erhöhter Oberkörper mit flach liegenden Beinen. Liegt zusätzlich eine Herzinsuffizienz vor, wird wie in Abb 2-15 gelagert

Abb. 2-18: Lagerung bei Volumenmangelschock. Oberkörper flach lagern u. Beine 30–45 Grad anheben

Abb. 2-19: Lagerung bei arteriellem Gefäßverschuß. Tief- u. Weichlagerung der Extremität

Abb. 2-20: Lagerung bei venösem Gefäßverschluss. Leichte Hochlagerung der Extremität

- **Oberkörperhochlagerung** mit Beugung im Hüftgelenk um $30-45^\circ$. Man profitiert von den Vorteilen der Ganzkörperschräglage ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen (Abb. 2-18).

Schlaganfall

- **Oberkörperhochlagerung** bei erhaltenem Bewußtsein u. art. Hypertonie.
- **Flachlagerung** bei Hypotonie, Drehung des Kopfes zur Seite wegen Aspirationsgefahr; Fixierung der paretischen Extremitäten.
- **Stabile Seitenlage** bei Bewußtlosigkeit.

Art. Verschlusskrankheit (→ AVK). Flachlagerung bei art. Gefäßverschluss, Tief- u. Weichlagerung der Extremität verschaffen Schmerzlinderung (Abb. 2-19).

Venöser Gefäßverschluss. Oberkörperflach- u. Hochlagerung der Extremität bei Thrombophlebitis od. Phlebothrombose reduzieren den art. Zustrom u. damit das Blutvolumen in der geschwollenen, verfärbten Extremität (Abb. 2-20).

2.1.2.2 Gynäkologisch-geburtshilflicher Notfall, spezielle Verletzungen

Uterusblutung

- **Fritsche-Lagerung** bei postpartaler atonischer Nachblutung sowie bei vaginaler Blu-

tung infolge EU od. Korpuskarzinom → Die Patientin liegt auf dem Rücken mit ausgestreckten u. übereinandergeschlagenen Beinen, ggf. kombinieren mit Schocklage.

Vena-cava-Kompressionssyndrom (aortokavales Kompressionssyndrom; Abb. 2-26):

- **Flachlagerung bei Linksseitenlage.** Die Schwangere wird 20° auf die li. Seite gelagert. Zusätzlich wird die re. Körperhälfte mit einem Keil od. einer Decke unterpolstert.

Das aortokavale Kompressionssyndrom (= Vena-cava-Kompressionssyndrom) ist durch den Druck des graviden Uterus auf die untere Hohlvene (V. cava inf.) in Rückenlage bedingt. Der Blutdruckabfall entsteht durch relativen Volumenmangel.

Gesichts-, Schädel-, Abdominalverletzung

Gesichtsverletzung. Verletzung u. Blutung im Mund-Rachen-Raum sind häufig miteinander verknüpft:

Bauchlage bei Spontanatmung, Bewußtseinsklarheit, Brust- u. Stirn sind zu **unterpolstern**. Blut u. Speichel fließen ab. Das seitliche Vorbringen der Arme führt zu einer zusätzlichen Stabilisierung (Abb. 2-22).

Flachlagerung bei Wirbelerletzung: Der Verletzte ist auf einer harten Unterlage, z. B. Va-

Abb. 2-21: Lagerung bei Schädel-Hirn-Trauma. Oberkörperhochlagerung; suffiziente Kreislaufparameter vorausgesetzt

Abb. 2-22: Lagerung bei Gesichtsverletzungen. Bauchlage, Stirn u. Kinn unterpolstern (suffiziente Spontanatmung vorausgesetzt)

Abb. 2-23: Lagerung bei Wirbelsäulenverletzungen. Immobilisation möglichst durch Vakuummatraze

Abb. 2-24: Aufhebung von der Seite. Bei Wirbelsäulenverletzung unter leichtem Zug am Kopf; mögliche Alternative zur Schaufeltrage

Abb. 2-25: Lagerung bei Akutem Abdomen. Unterpolstern der Knie zur Entspannung der Bauchdecke

Abb. 2-26: Lagerung beim Vena-cava-Kompressionssyndrom

kuummatratze zu lagern. Dies verhindert eine Verschiebung von Knochenfragmenten. Vor der Lagerung ist die HWS zu immobilisieren (Abb. 2-23).

Schädel-Hirn-Trauma

- **Oberkörperhochlagerung** (20–30° erhöhter Oberkörper) bei stabilem Kreislauf, achsen-gerechte Kopfhaltung (→ verbesserter venöser Abstrom → intrakranieller Druck ↓, Abb. 2-21).
- **Flachlagerung im Schock**, um dem geminderten zerebralen Perfusionsdruck durch erniedrigten art. Mitteldruck entgegenzuwirken.
- **Flachlagerung bei Schädelbasisbruch** (→ Blutung od. Liquorausstritt aus Nase, Mund, Ohren) beugt einer Luftembolie vor.

Aufheben von der Seite. Das Anheben erfolgt durch mehrere Helfer von der Seite, die auf Kommando den Patienten gleichzeitig gestreckt auf die Trage umlagern. Der Arzt hält den Kopf unter mäßigem Dauerzug (Abb. 2-24).

- Sicherer ist eine **Schaufeltrage**, die von beiden Seiten unter den Patienten gebracht u. an Kopf- u. Fußende arretiert wird. Anschließend ggf. Umlagerung auf die Vakuummatratze.

Bauchverletzung, Akutes Abdomen. Flachlage-rung. Zur peritonealen Entspannung wird eine **zusammengerollte Decke unter die angezogenen Knie** geschoben (→ Schmerzminderung!); eine Schocklagerung ist zusätzlich möglich (Abb. 2-25).

2.2 Blutstillung, Wundbehandlung

E. E. Scheller, J. Grönniger

2.2.1 Blutstillung

Folge von äußerlichen Verletzungen sind exogene Blutungen. Im Sinne der Schockprophylaxe ist eine adäquate Blutstillung vordringlich (s. Kap. 6.1.1).

Leichte Blutungen sistieren *spontan* nach wenigen Min.. Keimfreie Wundabdeckung zur Infektionsprophylaxe ist ausreichend.

Starke Blutungen sind durch *lokalen Druck* direkt auf die Wunde zu stillen. Weitere Maßnahmen:

- *Abdrücken* der zuführenden Arterie
- *Druckverband* u. *Hochlagerung* bei Extremitätenblutung.

Digitale Kompression

- *Arterien in Knochennähe*: A. temporalis, A. facialis, A. carotis, A. subclavia, A. brachialis, A. axillaris, A. femoralis, A. poplitea (Abb. 2-27).
- *Bauchaoorta* in Nabelhöhe gegen die WS komprimieren als ultima ratio bei Abriß der unteren Extremität.

Druckverband. Druckpolster können Verbandpäckchen od. Papiertaschentuchpäckchen sein (Abb. 2-28). Durch das in die Bindengänge eingewickelte Druckpolster entsteht ein lokaler Druck auf die Wunde mit Verringerung des Blutstromes ohne Störungen des venösen Rückflusses.

Abbildung. Zuvor digitale Kompression u. Druckverband versuchen, s. u.!

Weiches Material von mind. 4 cm Breite verwenden, am schonendsten ist die Blutdruckmanschette (→ 300 mmHg am Oberarm, 500 am Oberschenkel), die proximal der Verletzung angelegt wird. Distal der Abbindungsstelle dürfen keine Pulse zu tasten sein.

Praxishinweis: Abbindungen dürfen nicht an Gelenken angelegt werden (→ drohende Nervenschädigung), am zweckmäßigsten liegen sie in der Mitte von Oberarm u. -schenkel.

Abb. 2-27: Abdruckstellen nach Gorgass

Die komplette Abbildung, insbesondere des Beines, ist nicht einfach; für die Abschnürung ist ein erheblicher Kraftaufwand erforderlich. *Dokumentiert* (Begleitdokument) werden:

- Uhrzeit der Abschnürung
- Name des Abschnürenden (Arzt, Rettungsassistent).

Nach spätestens 2 Std. muß die Abbildung für 5–10 min geöffnet werden.

Amputationsverletzung (s. Kap. 2.3.2, S. 26).

Abb. 2-28: Druckverband nach Mehrkens

- Stark blutende Extremitätenstümpfe werden durch sterilen Wund- mit elastischem Kompressionsverband versorgt.
- Gefäßstümpfe *nicht abklemmen*, da dies die op. Revaskularisation behindert!
- Das Amputat wird in Mull od. einen sauberen Plastikbeutel eingewickelt (s. Kap. 4.5).
- Amputationsstumpf hochlagern → verhindert Wundödem.

Praxishinweis: Es besteht die Verpflichtung, nach Amputaten zu suchen.

Replantation. Amputationsverletzungen von *Finger, Hand (u. Unterschenkel)* sind mikrochir. oft replantationsfähig. Bei lebensbedrohlicher Verletzung ist die Replantation ggf. nicht indiziert. Dies zu entscheiden fällt am Unfallort schwer. Im Zweifelsfalle sollten daher die Voraussetzungen für eine Replantation erhalten werden.

Abgetrennte Gliedmaßen werden in einem sterilen Plastikbeutel trocken verpackt. Dieser wird auf Eis (kein Trockeneis) gekühlt.

- Kein direkter Kontakt des Amputates mit Flüssigkeit u. Eis
- Primäreinweisung in ein Zentrum mit Replantationsmöglichkeit
- Perforierende Gegenstände müssen abgesehen, belassen u. erst im OP entfernt wer-

den; tamponierte Blutungsquellen könnten anderenfalls aktiviert u. massive Blutverluste die Folge sein.

- Extrem perforierende Gegenstände unter keinen Umständen am Unfallort entfernen!

2.2.2 Wundbehandlung

Stark klaffende od. art. spritzend blutende Wunden setzen dramatische Akzente; imperative therapeutische Aktionen scheinen unausweichlich, doch sind fast immer einfache Maßnahmen gefragt! Die Liste dessen was zu unterlassen ist, ist länger als die der notwendigen Behandlung.

Allgemeine Wundbehandlung

Unterlassen: eingehende Wundtoilette am Unfallort.

Die Gefahr einer Keimeinschleppung ist um ein Vielfaches größer als der vermeintliche Reinigungseffekt. Insbesondere sind eingehende Inspektionen, was die Tiefe der Wunde angeht, unnötig. Die Wunde sollte nicht mit den Händen berührt werden.

Fremdkörper beläßt man, wenn sie nicht offensichtlich locker im Hautniveau liegen.

Wunddesinfektion ist am Unfallort überflüssig. Schon gar nicht sollte mit farbstoffhaltigen Desinfizienzien gearbeitet werden, die die spätere exakte Beurteilung bei der definitiven Ver-

sorgung erschweren. Auch bei spektakulären Wunden reicht fast regelmäßig das Abdecken mit einem sterilen Verband, bei stärkerer Blutung durch einen Kompressionsverband aus. Sind in der Notsituation Verbandstoffe nicht verfügbar, kann auf saubere Taschentücher od. ähnliches zurückgegriffen werden.

5 Regeln der Wundbehandlung

- Ruhe bewahren.
- Wenig an der Wunde selber tun.
- Steriler Verband.
- Kompression bei Blutung.
- Erstverband bleibt auf der Wunde bis zur definitiven Versorgung.

Großflächige Verbrennungen (s. Kap. 4.8.2) werden vor Ort mit Leitungswasser gekühlt (Vermeidung weiterer thermischer Schäden, analgetischer Effekt) u. lokal überhaupt nicht versorgt. Die verbrannten Körperpartien werden in sterile Einmalpapiertücher eingeschlagen, wie sie für die Abdeckungen im OP verwendet werden. Weitere Maßnahmen (z. B. Auftragen von Salben od. Puder) sind zu unterlassen, um nicht die Versorgung in der Klinik zu gefährden, mit Ausnahme einer ausreichend systemischen Analgesie.

Eingebrannte Stoffe (z. B. Hemd, Hose) werden erst in der Klinik entfernt.

Organspezifische Wundbehandlung

Kopfwunde. Zuerst sind *Atemwege* freizumachen, -halten selbst wenn dabei die Wunde berührt wird. Intubation bei Blutungen im Oropharynx beugt der Blutaspiration vor.

Keine weiteren „Wundmaßnahmen“ bei:

- ausgedehnten Verletzungen im Gesichts-/Schädelbereich.
- Perforierenden Verletzungen im Mund-/Kieferbereich.
- Perforierender Augenverletzung.
- Bei offenen Schädel-/Hirnverletzung ist jeder Versuch zu unterlassen, Hirnmasse zurückzudrängen od. deren Austreten durch einen Kompressionsverband zu unterbinden.

Halswunden gehen mit starker Blutung einher (viele große Gefäße!).

- Die *Aa. carotes* liegen relativ tief u. werden selten in Mitleidenschaft gezogen, auch nicht bei suizidaler Verletzung.
- Blutungen aus den *großen Halsvenen* wirken dramatisch. Fast immer reicht auch hier eine milde Kompression, die einseitig mit einer sterilen Kompresse per Hand erfolgt. Zirkuläre Druckverbände sind verboten. Unter Umständen muß die manuelle Kompression bis zur definitiven Wundversorgung in der Klinik fortgesetzt werden.
- *Luftröhrenverletzung.* Schnitt-, Rißverletzung können (selten!) die Trachea erreichen; hier besteht Intubationspflicht! *Symptome* sind Hautemphysem am Hals od. Blasenbildung im Blutsee.

Thoraxwunde. Atemmechanik beobachten! Perforierende Thoraxverletzungen sind bei Stich- u. Schußverletzung mit kleinen z. T. ganz unscheinbaren Wunden häufiger als bei ausgedehnten.

- *Pneumo-, Spannungspneumothorax* (s. Kap. 3.3.1). Ein Hautemphysem an der Verletzungsstelle weist auf einen Pneumothorax hin. Die Luft im Pleuraspalt stammt ganz überwiegend (80%) aus dem luftführenden System der mitverletzten Lunge.
- *Hämatothorax.* Bei Stichverletzung der Interkostalararterien kann eine unerkannte Blutung in den Pleuraraum zu einem ausgedehnten Hämatothorax führen, der oft mit dem Pneumothorax kombiniert ist.

Kreislauf u. Atmung sind zu überwachen. Im Zweifel bringt eine rasche Probepunktion vor Ort mit einer großlumigen Kanüle (Blutentnahme-Kanüle) Klarheit.

Abdominale Wunde. Die Verletzung von Hohlorganen mit Peritonitis ist bei der Erstversorgung zweitrangig, bedrohlicher sind unerkannte abdominelle Blutungen.

Stichwunden sind bis zum Beweis des Gegenteils als *perforierend* zu betrachten.

Offensichtlich perforierende abdominelle Verletzungen kenntlich am Darmvorfall, bereiten diagn. keine Schwierigkeiten. Repositionsversuche sind zu unterlassen, statt dessen sterile Abdeckung von Wunde u. vorgefallenen Organen.

Extremitätenwunde: Wenn größere Arterien betroffen sind, imponieren Wunden an Armen u. Beinen durch ihre erhebliche Blutung.

Praxishinweis: Entgegen weitverbreiteter Meinung reicht auch bei Verletzung größe-

rer Arterien der *lokale Druckverband* aus (u. U. Dosierung der Kompression durch Blutdruckmanschette); selten ist eine *Abschnürung* (Abbindung) erforderlich (s. o.!).

Amputationsverletzung: s. Kap. 2.3.2, S. 26.

2.3 Fraktur, Amputatversorgung

Chr. K. Lackner, St. Ruchholtz, D. Nast-Kolb

Frakturhäufigkeit. Extremitätenverletzungen sind häufigste Einsatzindikation in der traumatologischen Notfallmedizin. Bei Polytraumatisierung ist die Inzidenz mit 72–90% extrem hoch; durchschnittlich treten 2–3 Frakturen/Patient auf.

Folge

- *direkte Wirkung* auf die Weichteile.
- *Frühfolge* → pathogenetischer Faktor des Schocks.
- *Spätfolge* → 70% leiden 7–10 Jahre nach einer Polytraumatisierung unter Schmerzen. Insbes. Residuen aus Verletzungen der unteren Extremität schränken die Lebensqualität ein.
- *Indirekt systemische Wirkung.* Sind Oberschenkel od. Becken frakturiert od. liegt ein Polytrauma (s. Kap. 6.1) vor, ist mit *lebensbedrohlichem Blutverlust* zu rechnen (s. Abb. 4-18, S. 132).

2.3.1 Frakturversorgung

Die **direkte Gewalteinwirkung** betrifft die Frakturregion u. geht mit größerem Weichteilschaden einher.

- *Beispiel:* Unterschenkel-Querfraktur bei Stoßstangenverletzung.

Indirekte Gewalteinwirkung. Der Knochenschaden wird durch bruchferne Gewalteinwirkung verursacht.

- *Beispiel:* Unterschenkel-Spiralfraktur bei Ski-Drehsturz.

Minderperfusion. Blutungen in die Weichteile (Hämatome) u. *Weichteilödem* kompromittieren die Durchblutung. Minderperfusion u. Hypoxie begünstigen Infektionen, beeinträchtigen die phagozytotische Aktivität der Makrophagen u. neutrophilen Granu-

lozyten (deren Sauerstoffbedarf nach Phagozytose steigt um den Faktor 15–20) → Infektionsgefahr ↑.

Kompartmentsyndrom (= Logensyndr.). V. a. am Unterschenkel auftretendes Syndr., das durch Gewebedrucksteigerung in einem geschlossenen Muskelkompartiment (Faszienloge) u. dadurch bedingter Minderdurchblutung zu neuromuskulären Ausfällen u. Muskelnekrose führt.

Neben der lokalen Störung Aktivierung humoraler Kaskadensysteme u. zellulärer Abwehrreaktion mit Liberation von Mediatoren, welche für Endothelläsionen u. sek. Organschäden u. -versagen verantwortlich sind.

Beurteilung des Weichteilschadens (n. Oestern)

G-Fraktur mit geschlossenem (G) Weichteilschaden:

- *Grad 1 (G 1):* oberflächliche Schürfung, Hautkontusion, Fragmentdruckstellen von innen.
- *Grad 2 (G 2):* tiefe, kontaminierte Schürfung, umschriebene Haut- u. Muskelkontusion, drohendes Kompartmentsyndrom.
- *Grad 3 (G 3):* ausgedehnte Hautkontusion, Quetschung mit subkutanem Decollement, Muskelquetschung, manifestes Kompartmentsyndrom oder begleitender Gefäßverletzung.

O-Fraktur mit offenem (O) Weichteilschaden (Abb. 2-29):

- *Fraktur 1. Grades (O 1):* Durchtrennung der Haut mit fehlender od. geringer Kontusion, wobei die Haut durch ein Knochenfragment von innen nach außen durchspießt wurde
→ einfache, unkomplizierte Frakturen.