W. Ehalt · Unfallpraxis

UNFALLPRAXIS

von

PROFESSOR DR. WALTHER EHALT

Ärztlicher Leiter des Unfallkrankenhauses Graz

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. LORENZ BÖHLER

und Beiträgen von

Doz. Dr. ERNST PURTSCHER, Wien und Doz. Dr. E. H. MAJER, Wien

4., völlig neu bearbeitete Auflage mit 297 Abbildungen

WALTER DE GRUYTER & CO.

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung · J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung
Georg Reimer · Karl J. Trübner · Veit & Comp.

BERLIN 1968

Copyright 1968 by Walter de Gruyter & Co., vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp., Berlin 30, Genthiner Straße 13. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe, der Herstellung von Mikrofilmen und der Übersetzung, vorbehalten. Printed in Germany. — Archiv-Nr. 51 38 681
Satz und Druck: Walter de Gruyter & Co., Berlin 30

MEINER FRAU GEWIDMET

Geleitwort

Die steigende Industrialisierung, die zunehmende Motorisierung des Verkehrs und die allgemeine Verbreitung des Sportes haben eine ungeheuere Zunahme der Unfälle zur Folge gehabt und ihre Zahl wird trotz aller Verhütungsmaßnahmen noch unaufhaltsam weiter steigen.

Die Behandlung der durch Unfall entstandenen äußeren und inneren Verletzungen hat immer schon, seit es Menschen gibt, zu den vornehmsten Aufgaben der Heilkunde gehört. Die Wunden, die Knochenbrüche und die Verrenkungen stehen dabei im Vordergrund, während die Verletzungen der inneren Organe weniger als 1% ausmachen.

Die Folgen von Verletzungen sind nicht immer unabwendbare Unfallfolgen, sondern viel häufiger vermeidbare Behandlungsfolgen, wie z. B. Entzündungen nach offenen Wunden oder Verkürzungen, Verbiegungen, Verdrehungen, Muskelschwund und Versteifungen nach offenen und geschlossenen Knochenbrüchen und anderen Verletzungen. Daß man diese Folgen durch eine zweckmäßige Behandlung in der Regel vermeiden kann, hat EHALT schon in seinem 1938 erschienenen Buche: „Die offenen Brüche der langen Röhrenknochen und ihre Behandlungsergebnisse“ mit noch nie dagewesener Genauigkeit bewiesen.

Um die Verletzten möglichst rasch und möglichst vollkommen wieder herzustellen, ist Schulung und Organisation notwendig. Die erste Hilfe muß gelehrt werden, der Transport muß rasch vor sich gehen, und es müssen entsprechende Behandlungsstätten vorhanden sein. In diesen müssen Männer wirken, die sich ganz und gar der Unfallheilkunde verschrieben haben. Sie sind nicht nur berufen, die vermeidbaren Behandlungsfolgen auf ein Mindestmaß herabzusetzen, sondern auch aus ihren reichen Erfahrungen den Studenten das zu geben, was sie für ihre spätere Praxis brauchen.

Ich begrüße es deshalb besonders, daß mein langjähriger Mitarbeiter EHALT, der den Lehrauftrag für Unfallchirurgie in Graz hat, es unternommen hat, dieses handliche Buch zu schreiben. Es faßt in knapper Form zusammen, was der Student für die Prüfung über die Unfallversicherung und über die Erkennung,

Behandlung und Begutachtung von Verletzten wissen muß und was er später in die Tat umsetzen kann. Mit großem Geschick sind die Erkennungszeichen aller Unfälle beschrieben und, was noch wichtiger ist, mit guten Abbildungen erläutert. Die Behandlung hingegen ist nur von jenen angegeben, bei welchen sie der praktische Arzt selbst durchführen kann. Bei den schweren Unfällen, die ins Krankenhaus gehören, ist sie nur gestreift. Zum Schluß ist auch das Wichtigste über die Begutachtung angeführt, so daß die Lernenden einen entsprechenden Überblick über das ganze Gebiet bekommen können.

LORENZ BÖHLER

Vorwort zur 4. Auflage

Seit der letzten Auflage haben sich in allgemein-medizinischer und auch unfallchirurgischer Hinsicht so viele Neuerungen und neue Gesichtspunkte ergeben, daß diese 4. Auflage vollständig umgearbeitet werden mußte.

Die Unfälle haben nicht nur zahlenmäßig, sondern auch der Schwere nach beachtlich zugenommen; man braucht nur an die Straßenverkehrsunfälle zu denken. Dadurch ist die Unfallchirurgie als eigenes Fach noch wichtiger geworden. Andererseits *ist die Zusammenarbeit mit den anderen Fächern* — man nennt es jetzt teamwork — wegen der multiplen Verletzungen *noch bedeutungsvoller als früher*.

Schon die „Erste Hilfe“ hat — hauptsächlich infolge der zunehmenden schweren Straßenverkehrsunfälle — sehr an Bedeutung zugenommen und ist in letzter Zeit viel in der Öffentlichkeit diskutiert und auf breiter Basis an die ganze Bevölkerung herangetragen worden. Deshalb wurde dieses Kapitel entsprechend erweitert. Auch der praktische Arzt muß die „Erste Hilfe“ beherrschen.

Die moderne Bekämpfung des Schocks und des primären Blutverlustes wurde in den Text eingebaut. Der Mensch kann bekanntlich *3 Wochen ohne Nahrungsmittel, 3 Tage ohne Wasser*, das Gehirn *jedoch nur 3 Minuten ohne Durchblutung* leben, ohne daß irreparable Schäden oder der Tod eintreten! Diese Tatsache ist unter Umständen ausschlaggebend für die „Erste Hilfe“.

Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen dem ersten und 18. Lebensjahr sind nach internationaler Statistik die Unfälle die häufigste Ursache der Morbidität und Mortalität geworden. Alle anderen Erkrankungen einschließlich Tuberkulose und Poliomyelitis sind in den Hintergrund gedrängt.

An neuen Behandlungsmethoden wurde die stabile Osteosynthese mit Marknagel, Schrauben und Platten weiter entwickelt, ebenso die Markdrahtung; die gekreuzten Bohrdrähte, die „*Operation mit verzögerter Dringlichkeit*“ u. a. wurden in die unfallchirurgische Therapie eingeführt; Handchirurgie und Rehabilitation wurden weitgehend ausgebaut.

Für die Beratung bei den „Versicherungsrechtlichen Grundlagen“ danke ich den Herren DR. HERZEG, Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt, Landesstelle Steiermark; Direktor DR. KAPLAN, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Landesstelle Graz; PROF. DR. LANG, SUVA-Luzern; DR. LAUTERBACH, Leiter des Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften Bonn; PROF. DR. RENKER,

Halle (Saale) und DR. SLANEC, Generaldirektor der Internationalen Unfall- und Schadensversicherungs-A.G. Wien, für die Durchsicht des Manuskriptes Herrn cand. med. WALTER SCHEINER.

Ich habe versucht, alle diese Fortschritte entsprechend in die Neuauflage einzubauen und habe eine beträchtliche Anzahl Abbildungen durch neue Bilder ersetzt und andere neu aufgenommen, damit der Student und praktische Arzt wenigstens die Grundprinzipien kennenlernt, und ich hoffe, daß mir dies weitgehend gelungen ist.

Graz, Januar 1968

WALTHER EHALT

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
--------------------------	-----

Allgemeiner Teil

Erste Hilfe	1
A. Atemspende	3
B. Schock	4
C. Schmerzstillung	4
D. Bewußtlosigkeit	4
E. Störungen der Atmung	5
F. Verletzungen der inneren Organe der Körperhöhlen	5
G. Wunden	6
H. Blutverlust	6
I. Verbrennungen	8
K. Erfrierungen	8
L. Elektrische Verletzungen, Blitzschlag	9
M. Verätzungen	9
N. Vergiftungen	9
O. Knochenbrüche	10
P. Offene Knochenbrüche	13
R. Prellung, Zerrung, Bluterguß	13
S. Verrenkungen	13
T. Fremdkörper	13
U. Augenverletzungen	13
Lebensbedrohliche Folgen schwerer Unfälle	14
A. Blutverlust	14
B. Schock, Kollaps	14
C. Crushsyndrom	15
D. Fettembolie	16
E. Lungenentzündung	16
F. Delirium tremens	16
G. Posttraumatischer KORSAKOFF	17
H. Dekubitus	17
Zufallswunden und ihre Folgen	18
A. Hautabschürfungen	18
B. Bagatellverletzungen	18
C. Fremdkörper	19
D. Zufallswunden	20
1. Frische Zufallswunden	21
2. Antibiotika und Sulfonamide	25
3. Veraltete und alte Wunden	27
4. Infizierte Wunden	27

5. Fortschreitende Entzündungen	28
a) Sepsis	29
b) Septikopyaemie	29
c) Erysipel (Rotlauf)	29
d) Gasbrand, Gasphegmone, malignes Oedem	30
e) Wundstarrkrampf.	31
Richtlinien für die Vorbeugung des Tetanus	31
Verbrennung	34
Erfrierung	37
Elektrische Unfälle.	37
Prellungen, Zerrungen, Bänderrisse, Blutergüsse	38
Knochenbrüche (Frakturen) und ihre Folgen	40
A. Die wesentlichen Bruchformen.	41
B. Komplikationen	44
C. Häufig übersehene Brüche und Verrenkungen	45
D. Behandlung der Knochenbrüche	45
1. Durchschnittliche Zeit bis zum Festwerden	50
2. Störungen der Knochenbruchheilung	50
E. Folgen von Knochenbrüchen	51
1. Ödem	51
2. Posttraumatische Osteoarthrose	52
3. Myositis ossificans	52
4. Callus luxurians	52
5. Brückenkallus.	52
6. Muskelschwund, Kalkschwund	52
7. SUDECKSche Dystrophie	53
8. Ischämische Muskelkontraktur	53
9. Ermüdungsbrüche	54
F. Pathologische Frakturen, Spontanfrakturen	54
Ankylosen, Arthrodesen, Kontrakturen	55
Verrenkungen	55
Das Röntgenverfahren	57
Betäubung.	61
A. Örtlich	61
B. Subaxillar	62
C. Rückenmark	63
D. Intravenös	64
E. Rausch	64
F. Allgemeines	64

Ruhigstellung	65
A. Fingerschiene	66
B. Gipsverband	67
1. Typische Gipsverbände	69
a) Dorsale Gipsschiene	69
b) Oberarmgips-Verband	70
c) U-Schiene	71
d) Unterschenkelgips	71
e) Verlängerung des Unterschenkelgipses bis Mitte Oberschenkel	72
f) Gehbügel	73
g) Gipshülse	73
h) Beckengips	74
i) Gipsmieder	75
k) Kopf-Rumpf-Gips	75
l) Fingergipsschiene für den Strecksehnenriß bzw. -ausriß	76
C. Hals- (Schanz)Krawatte	76
D. Zinkleimverband	76
E. Elastoplastverband	77
F. Einlagen	78
G. Quengelverbände	78
H. Doppelrechtwinkelschiene	79
I. Schlüsselbeinschiene	80
K. Streck- = Extensionsverbände	80
L. Verbände	81
Nachbehandlung	83

Besonderer Teil

Schädel	87
A. Wunden	87
B. Infektionen	87
C. Knochenbrüche	87
D. Verrenkungen im Kiefergelenk	89
E. Schädelinhalt, zentrale Nerven	89
Periphere Nerven	93
A. Offen	93
B. Stumpf	93
C. Typische Lähmungen	93
Hals	97
Ohr, Obere Luft- und Speisewege (Doz. Dr. E. H. MAJER, Wien)	97
A. Ohr	97
B. Nase	101
C. Rachen	102
D. Kehlkopf	102
E. Ösophagus (Speiseröhre)	103

Auge (Doz. Dr. E. PURTSCHER, Wien)	105
A. Lider	106
B. Bindehaut.	106
C. Hornhaut	107
D. Lederhaut	108
E. Verletzungen des Auges im ganzen	108
F. Verätzungen	108
Wirbelsäule	110
A. Zerrungen	110
B. Prellungen	110
C. Knochenbrüche	110
D. Verrenkungen	112
E. Verrenkungsbrüche	113
F. Querschnittslähmung	113
G. Abrisse und Abbrüche der Dorn- und Querfortsätze	113
Nierenquetschung	116
Zwischenwirbelscheibenprolaps	116
Kreuzbein-Steißbein	116
Brustkorb	117
A. Herzstiche	117
B. Prellungen-Rippenbrüche	117
Bauch	118
Becken	120
A. Beckenbrüche	120
B. Pfählungen	121
Arme	122
A. Schultergürtel	122
1. Wunden und Infektionen	122
2. Stumpfe Verletzungen	123
a) Zur Schulterzerrung	123
b) Supraspinatusriß	123
c) Zerreißung	123
d) Die Schulterverrenkung	124
e) Verrenkung im Schulterblatt-Schlüsselbein = Schulterreckgelenk	127
f) Verrenkung im Brustbein-Schlüsselbeingelenk	128
g) Schlüsselbeinbruch	128
h) Brüche des Schulterblattes	131
i) Oberarmbruch unter dem Kopf	131
k) Verrenkungsbruch	133
l) Bruch des Tuberculum majus	133
m) Riß der langen Bizepssehne	133
n) Schulterversteifung	134

B. Oberarmschaft	134
C. Ellbogen	135
1. Wunden und Infektionen	135
2. Verrenkungen	135
3. Knochenbrüche im Bereiche des Ellbogens	137
D. Vorderarm	143
1. Wunden- Infektionen- Lymphgefäß-Entzündung	143
2. Chronische Sehenscheidenentzündung	143
3. Knochenbrüche	143
Bruch beider Vorderarmknochen	143
a) Isolierter Bruch des Speichenschafes.	143
b) Isolierter Bruch des Ellenschafes	144
c) Grünholzbrüche beider Vorderarmknochen bzw. der Speiche	144
d) Wulstbruch.	145
e) Speichenbruch an typischer Stelle	145
f) Epiphysenlösung am unteren Speichenende	148
E. Handgelenk	148
1. Wunden- Infektionen	148
2. Prellungen und Zerrungen.	148
3. Bruch des Kahnbeines	148
4. Brüche der übrigen Handwurzelknochen	150
5. Perilunäre Verrenkung der Hand	151
6. Verrenkungsbruch nach De Quervain	151
7. Mondbeintod	152
F. Hand und Finger	152
1. Bagatellverletzungen	152
2. Zufallswunden	153
3. Nagelbetteiterung	154
4. Panaritium cutaneum	154
5. Panaritium subcutaneum	154
6. Panaritium osseum	155
7. Eitrige Sehenscheidenentzündung	155
8. Panaritium articulare	156
9. Hohlhandinfektionen	157
10. Oberflächliche und tiefe Hohlhandphlegmone	157
11. Knochenbrüche	158
a) Mittelhand.	158
b) Bennettsche Fraktur	159
c) Fingergrund- und Mittelglieder	159
d) Fingerendglieder	161
e) Verrenkungsbrüche	161
12. Der Strecksehnenriß	161
13. Zerrungen und Bänderrisse an den Fingergelenken	161
14. Verrenkungen der Fingerglieder	162
15. Handrückenödem	162
Beine	163
A. Hüfte	164
1. Prellungen und Zerrungen	164
2. Hüftgelenksverrenkungen	164
3. Verrenkungsbrüche der Hüfte.	167

B. Oberschenkel	168
1. Wunden und Infektionen	168
2. Prellungen, Blutergüsse, Muskelquetschungen und -einrisse	168
3. Knochenbrüche	168
C. Knie	172
1. Wunden	172
2. Infektionen	173
3. Binnenverletzungen	173
4. Zerrungen und Prellungen	175
a) Knorpelabsprengung	175
b) Der Kniegelenkserguß	175
5. Bandverletzungen	176
a) Zerrungen des inneren Seitenbandes	177
b) Riß des inneren Seitenbandes	177
c) Riß der Kreuzbänder	178
d) Riß des äußeren Seitenbandes	178
e) Ausriß der Eminentia intercondyloidea	179
6. Verletzung des inneren Meniskus	179
7. Verletzung des äußeren Meniskus	179
8. Behandlung der Meniskusrisse	179
9. Kniegelenkverrenkung	180
10. Bruch der Kniescheibe	181
11. Verrenkung der Kniescheibe	182
12. Freie Körper	183
13. Riß der Rektussehne oberhalb der Kniescheibe und des Ligamentum patell. propr.	183
a) Meniskus-Zyste	183
D. Unterschenkel	183
1. Prellung, Blutergüsse, Muskelquetschungen	183
2. Der Riß der Achillessehne	184
3. Knochenbrüche	184
a) Schienbeinkopf	184
b) Isolierte Brüche des inneren bzw. äußeren Schienbeinknorrens	184
c) Infrakondylär	185
d) Brüche der Epiphyse und Epiphysenlösungen am oberen Schienbeinende	185
e) Schienbeinschaft	185
f) Bruch beider Unterschenkelknochen	185
g) Epiphysenlösung	186
h) Isolierter Bruch des Wadenbeines	186
4. Nachbehandlung nach Gipsabnahme	187
E. Sprunggelenk	188
1. Wunden-Infektionen	188
2. Zerrungen	188
3. Bandlockerung	188
a) Seitenlockerung	188
b) Supinationslockerung	189
4. Prellungen des Sprunggelenkes und des Fußes	189
5. Brüche im Bereiche des Sprunggelenkes	190
6. Offene Knöchelbrüche	192
7. Knöchelbrüche bei Kindern und Jugendlichen	192

F. Fuß	193
1. Wunden, Infektionen	193
2. Zerrungen-Prellungen	193
3. Knochenbrüche, Verrenkungen, Verrenkungsbrüche	193
a) Luxatio pedes cum talo	193
b) Bruch des Sprungbeines	193
c) Verrenkung des Fußes unter dem Sprungbein	193
d) Bruch des Fersenbeines	193
e) Verrenkung im CHOPART und im LISFRANC	194
f) Brüche der Mittelfußknochen	195
g) Brüche der Zehen	195
h) Verrenkungen der Zehenglieder	196
Versicherungsrechtliche Grundlagen	197
A. Österreich	197
B. Bundesrepublik Deutschland	197
C. Deutsche Demokratische Republik	198
D. Schweiz	198
E. Behandlungskosten	199
F. Arbeitsunfälle	199
G. Berufskrankheiten	201
H. Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten	201
I. Unfallheilbehandlung	201
K. Berufsfürsorge	201
L. Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten	202
M. Unfallkrankenhäuser	202
N. Rehabilitation	203
O. Private Unfallversicherungen	203
P. Haftpflichtversicherungen	203
R. Ärztliche Befunde	203
S. Operationsduldung	204
T. Aufklärungspflicht	204
U. Alkoholbestimmung im Blut	205
Die Begutachtung	207
Zusammenhangsfragen	212
Sachverzeichnis	217

Erste Hilfe

aber rasch, richtig und schonend!

Der Unfall ist geschehen. Der Verunglückte hört zu atmen auf. Er braucht 400 Sekunden, um zu sterben. In 400 Sekunden (6—7 Minuten) kann sein Leben bei richtiger Hilfe noch gerettet werden.

Lebenszeit

60—90 Sekunden	mit dem Sauerstoff i. d. Lunge
rund 135 Sekunden	mit dem Sauerstoff im Blut
rund 180 Sekunden	Gnadenfrist des Gehirns
<hr/>	
375—405 Sekunden	

**Der Mensch kann 3 Wochen ohne Nahrung,
3 Tage ohne Flüssigkeit,
aber nur 3 Minuten ohne Sauerstoff leben.**

Allgemeiner Teil

I. Erste Hilfe

Die sachkundige und zweckmäßige Erste-Hilfe-Leistung bei Unfällen ist für die anschließende Heilbehandlung von ausschlaggebender und manchmal lebenserhaltender Bedeutung.

Jeder Arzt und jeder Autofahrer ist verpflichtet, eine Erste-Hilfe-Tasche mit sich zu führen. Die meisten Rettungswagen des Roten Kreuzes führen alles Nötige für die ärztliche Erste Hilfe mit.

Bei Straßenverkehrsunfällen ist — falls die Polizei bzw. Gendarmerie noch nicht eingetroffen ist — mit Kreide oder einem sonstigen Behelf (Steinchen, Ästen u. ä.) die *Lage des Verletzten zu markieren*, bevor man Lageveränderungen vornimmt. Es ist wohl zweckmäßig, *auch* für den Arzt, die

Wichtigen Hinweise für die Erste Hilfe,

welche die „Erste-Hilfe-Fibel“ des Roten Kreuzes¹⁾ einleiten, hier anzuführen

1. Die Erste Hilfe besteht darin, weitere Schäden zu verhüten und die Verletzten möglichst bald und schonend in ärztliche Behandlung zu bringen.

2. Bewußtlose sofort auf die Seite lagern (Abb. 5). Beengende Kleidungsstücke öffnen. Nie Bewußtlosen etwas einflößen.

3. Verletzte behutsam aus der Gefahrenzone bringen. Einklemmte nie herauszerren. Nie selbst transportieren, lieber auf den Rettungswagen warten! (Kollaps, Bewußtlosigkeit, Blutung.)

4. Wunden nie mit den Händen berühren, nie auswaschen. Keimfrei verbinden. Splitter nicht aus Wunden entfernen (Blutung!).

5. Auch bei stark blutenden Wunden genügt fast immer ein Druckverband. Abbinden ist nur eine äußerste Notmaßnahme. Nach jeder Stunde muß die Abbindung kurz geöffnet werden. Abbindungszeit notieren und sichtbar beim Verletzten anbringen.

¹⁾ Dr. Kurt Hartmann, Verlag Hülhig & Dreyer, GmbH-Mainz bzw. Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz, Wien.

6. Daran denken, die Lage gebrochener und verrenkter Gliedmaßen nie mit Gewalt zu verändern, nur ruhig stellen. Ausnahme stark verdrehte und abgelenkte Gliedmaßen: die Verdrehung und Abknickung soll unter Zug behoben werden (gilt nicht für offene Knochenbrüche und offene Verrenkungen S. 13).

7. Der Mensch kann nur drei Minuten ohne Sauerstoff leben! Bei Atemstillstand sofort Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase beatmen (Abb. 3, 4). Beim Fehlen der Herztätigkeit sofort auch mit der Herzmassage beginnen (Abb. 1).

8. Verletzte nie unbeobachtet lassen. Vor Auskühlung und Sonnenbestrahlung schützen.

Für den Arzt folgendes:

9. Im Rahmen der Ersten Hilfe soll keine Diagnose gestellt werden, die nötigen Maßnahmen erfolgen nach den sichtbaren Symptomen.
10. Alles, was dem Verletzten im Rahmen der Ersten Hilfe gegeben wird, muß auf einen **Zettel aufgeschrieben** und dieser dem Verletzten **sichtbar angehängt** werden!

Der Erste-Hilfe-Leistende hat auch für folgendes zu sorgen: ob und wohin der Abtransport nötig ist (andere Verhältnisse im Sommer und Winter, in Stadt und Land); vor *Antritt* eines längeren Transportes ist für *Harnentleerung* zu sorgen!

Jeder Arzt sollte auch die Intubation erlernen!

Hilfsmittel, die man zur Ersten Hilfe braucht: Schnellverbandpäckchen, keimfreie Gaze, einige Binden (5—15 cm breit), Dreiecktücher, Heftpflaster, Sicherheitsnadeln, Instrumente (Pinzetten, Schere, Klemmen, Injektionsspritze, Nadeln²⁾ und Ampullen mit verschiedenen Medikamenten) und Material zur Schienung (Kramer- oder Boforschiene³⁾, Blechstiefel, sonst behelfsmäßig).

Das Wichtigste bei der Ersten Hilfe ist, sich den *entsprechenden Überblick über die Gesamtlage* zu verschaffen, zunächst über das Befinden des Verletzten. Man erforscht, ob der Verletzte ansprechbar oder bewußtlos ist, sieht nach der Atmung, fühlt den Puls (A. radialis, eventuell A. carotis); Erbrochenes sieht man in der Regel. Die Hauptschmerzen wird der Verletzte meist selbst angeben.

Der Wichtigkeit nach kommen: Tätigkeit des Herzens, Sauerstoffzufuhr für das Gehirn, Atmung!

Als *allererste Maßnahme* ist bei Herzstillstand die *äußere Herzmassage* durchzuführen: taktmäßiges kräftiges Eindrücken des unteren Brustbeines 60—70mal in der Minute mit den flachen übereinandergelegten Händen (**Abb. 1**). Die Erfolgsaussichten der Wiederbelebung bei Herzstillstand zeigt **Abb. 2**: sie sind bei einer Minute 98% und nach 10 Minuten nur mehr 1%.

²⁾ (am besten als Einmalgerät).

³⁾ Jet-Bandage.

Abb. 1. Äußere Herzmassage.

Abb. 2. Erfolgsaussichten bei Wiederbelebung.

A. Atemspende

Bei fehlender oder schlechter *Atmung* ist die *Atemspende Mund-zu-Mund* (*Mund-zu-Nase*) anzuwenden (Abb. 3), ein Taschentuch kann dazwischengelegt werden. Wichtig ist, daß der Kopf mit der einen Hand überstreckt und der Unterkiefer mit der anderen Hand nach vorne geschoben wird (Abb. 4). 10 bis 20 kräftige

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 3 u. 4. Lagerung und Mund-zu-Mund(Nase)-Beatmung.

Atemstöße, dann zirka $\frac{1}{2}$ Minute Pause, dann *ohne* Kraftanstrengung weiterbeatmen. Diese Art der Atemspende ist eine Notmaßnahme zum Überbrücken der Zeitspanne zwischen Atemstillstand und dem Eintreffen von Hilfsgeräten. Haben Herztätigkeit und Atmung ausgesetzt (*Scheintod*), so ist Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung *gleichzeitig* durchzuführen (im Verhältnis 5:1). Dies kann durch zwei Helfer gemacht werden. Steht nur ein Helfer zur Verfügung, so muß **Herzmassage und Atemspende abwechseln**:

auf neun Herzmassagen folgt eine Atemspende.

Bei Bewußtlosigkeit ist der Verletzte in die Seitenlage — *Sims* oder *Nato*-Position — (Abb. 5) zu drehen. Dabei ist als *Stütze gegen das Zurückfallen* die untere Schulter zurückzuziehen, das obere Bein ist in Hüfte und Knie rechtwinklig

Abb. 5. Seitenlagerung bei Bewußtlosen.

gebeugt, ebenso wird der obere Arm nach vorne gewinkelt. Durch diese Lagerung soll verhindert werden, daß die Bronchien mit Sekret verstopft werden und der Verletzte schon mit der beginnenden hypostatischen Pneumonie in das Krankenhaus kommt. Im Rettungswagen muß bei Bewußtlosen für Absaugung der Luftwege gesorgt werden. 10% der Bewußtlosen erleiden bereits während des Transportes eine *tödliche Aspiration*.

Lebensgefährliche *Blutungen* S. 6.

B. Schock

Bei *schwerem Schock*, auch S. 14, wird sofort eine i. v. Infusion eines Plasmaexpanders angelegt und — falls möglich — Sauerstoff zugeführt. Man kann die Beine hochlagern, eventuell auswickeln, falls dadurch der Abtransport nicht verzögert wird. Die medikamentöse Behandlung des Schocks ist sehr problematisch, vor allem muß ein stumpfes Bauchtrauma (S. 118) einwandfrei ausgeschlossen sein.

Bei *Schädel-Hirntraumen* ist wie bei Bewußtlosigkeit vorzugehen (Lagerung Abb. 5), eventuell eine Infusion anzulegen und diese während des Transportes zu belassen. Insbesondere gilt dies für die lebensgefährliche Durchblutungsstörung des Gehirnes, z. B. bei Blutverlust (S. 6).

Kehrt nach kurzer Bewußtlosigkeit das Bewußtsein wieder zurück, und wird der Verletzte dann wieder bewußtlos (*lucides Intervall*), so ist dies von demjenigen, der Erste Hilfe leistet, bei der Einlieferung in das Krankenhaus *unbedingt* mitzuteilen. Es besteht dann der *dringende Verdacht* auf eine *epidurale* Blutung (S. 91).

C. Schmerzstillung

Hier muß *äußerst vorsichtig* umgegangen werden; vor Alkaloiden oder anderen drastischen Mitteln ist zu warnen; es könnte dadurch eine eventuell gleichzeitig vorhandene stumpfe *Bauchverletzung* *verschleiert* werden.

D. Bewußtlosigkeit

Folgende Krankheitsbilder können außer Unfällen ebenfalls zur Bewußtlosigkeit führen:

Herzinfarkt,
Hirnschlag (Apoplexie),

Koma (diabeticum,
urämicum usw.),

alle Arten von Vergiftungen (narkotische Mittel, Lebensmittel, pflanzliche und tierische Gifte, S. 9), Alkohol, erkenntlich am Geruch. Häufig sind Spuren von Erbrochenem an den Kleidern oder in der Umgebung zu finden.

Bei Straßenverkehrsunfällen ist auf Grund gesetzlicher Bestimmungen an die Alkoholprobe zu denken (S. 205)! Gleichzeitige Unfälle sind nicht selten! — Ohnmacht durch Hitze,

schlechte Luft
(bei Versammlungen u. a.);
Hitzschlag (Sonnenstich);
krampfartige Ohnmachten (Hysterie,

Epilepsie);
Ertrinken;
elektrische Verletzungen, S. 37.

E. Störungen der Atmung

Ursachen:

Fremdkörper in den Atemwegen	Blitzschlag
Ertrinken	krankhafte Verengung der Luftwege
Erhängen	Giftgase (am häufigsten Leuchtgas,
Verschüttung	Grubengas, Auspuffgase)
Einwirkung von elektrischem Strom	narkotische Mittel

Zeichen: Gesicht blaurot, vergebliche Atemanstrengung, später Aussetzen der Atmung.

Erste Hilfe: Atemwege besichtigen und mit dem Finger säubern. Bei Ertrunkenen und Verschütteten wird der Kopf und Oberkörper tiefgelagert, der Oberkörper ausgeschüttelt, wobei die Zunge vorgezogen wird.

Künstliche Beatmung (Abb. 3, 4): Diese ist fortzusetzen, bis Selbstatmung auftritt oder bis zum einwandfreien Eintritt des Todes (eventuell 2 bis 5 Stunden).

Giftgase: In frische Luft bringen. Künstliche Atmung ist verboten bei Reizgiften (Chlor, Phosphor, Nitrosegase); eventuell Luftröhrenschnitt.

F. Verletzung der inneren Organe der Körperhöhlen

Kopf: Schädelhirntrauma S. 89, Blutungen S. 91;

Kopf: Wunden bzw. freiliegende Gehirnteile sind keimfrei zu verbinden.

Brustkorb: Als Komplikation von Rippenbrüchen, einer Stichwunde oder Riß-quetschwunde kann der Pleuraraum eröffnet bzw. die Lunge mitverletzt sein. Es kann zur Luftansammlung im Brustraum (= Pneumothorax), zur Blutung darin (= Haematothorax) oder zur Kombination (= Haematopneumothorax) kommen. Durch alle diese Vorgänge wird die Lunge zusammengedrückt, es kommt zur Atemnot.

Gegenmaßnahmen: Lagerung mit erhöhtem Oberkörper, eventuell Lagerung auf die verletzte Seite, damit die nicht verletzte Lunge besser atmen kann. Bei offenem Pneumothorax S. 117 (Abb. 8). Eine Sonderform ist der *Spannungspneumothorax*, bei welchem die Luft zwar in den Pleuraraum hinein-, aber infolge der Ventilwirkung nicht mehr heraus kann. Es kann zur lebensbedrohlichen Verdrängung des Mediastinums kommen. Die Erste Hilfe besteht im Einstechen einer dicken Nadel, an deren äußerem Ende ein durchlöcherter Gummifingerling als Gegenventil befestigt ist (Abb. 9).

Abb. 9. Durchlöcherter Gummifingerling auf einer dicken Nadel, welche beim Spannungspneumothorax zwischen den Rippen durch, in den (mit Luft gefüllten) Pleuraraum eingestochen wird

Bauch: Durch Schlag, Stoß, Fall, bei einem Straßenverkehrsunfall u. a. kommt es zu einem stumpfen Bauchtrauma (S. 118); durch Stich, Schuß usw. zur traumatischen Eröffnung der Bauchhöhle.

In beiden Fällen können verschiedene Bauchorgane verletzt sein. Dringende Abgabe in das nächste Krankenhaus, nichts zu trinken oder zu essen geben, keine schmerzstillenden Mittel (S. 119). Wunden bzw. vorgefallene Eingeweide sind mit einem keimfreien Verband zu bedecken.

G. Wunden

**Wunden nicht berühren! Wunden nicht auswaschen!
Keine Antiseptika (Sublimat, Karbolwasser, Alkohol,
Abb. 6). Keine Watteverbände, auch nicht sogenannte
blutstillende! Nur steril verbinden!**

Dies gilt auch für die kleinsten Wunden: ohne Verband darf nicht weitergearbeitet werden (Blutvergiftungsgefahr!).

Jod soll vermieden werden, da es mit der Zeit zu konzentriert wirkt und eine Dermatitis erzeugen kann. Hautabschürfungen läßt man am besten abtrocknen.

Bei allen Wunden am Arm muß man sofort *Ringe abnehmen*.

Alle Wunden innerhalb von 6 Stunden zum Arzt bringen (S. 20).

Abb. 6. Schwere Entzündung des ganzen Gesichtes und beginnende Meningitis nach kleiner Rißquetschwunde am rechten Unterlid, welche mit Alkohol vor 3 Tagen ausgewaschen wurde (auswärtiger Fall).

H. Blutverlust

Blutverlust kann nach innen oder außen erfolgen und unter Umständen lebensgefährlich werden.

Das Gehirn verträgt einen Sauerstoffausfall nicht länger als 3 Minuten, dann tritt eine irreparable Schädigung ein.

Ähnliches gilt auch für die parenchymatösen Organe wie Herz, Leber und Niere. Auch massive Bluttransfusionen helfen nach dieser Zeit nicht mehr!

Bei Kindern wird der Blutverlust, auch nach außen hin, häufig unterschätzt. Man bedenke, daß ein Neugeborenes nur 350 ml Blut besitzt.

Äußere Blutungen: Bei stärkerer *äußerer Blutung* an den Gliedmaßen wird zuerst der verletzte Arm oder das verletzte Bein steil in die Höhe gehoben, die Wunde steril verbunden. Steht die Blutung nicht, dann macht man einen *Druckverband* mit mehreren Verbandpäckchen bzw. bindet unter Druck Zellstoff oder sonst gerade vorhandenes weiches Material auf die steril verbundene Wunde. Hilft dies nichts, dann wickelt man neuerlich einen Druckverband darüber. Erst wenn es trotzdem blutet, legt man die *ESMARCHSche Binde (Blutsperre)* an (Gummischlauch, Hosenträger usw.). Diese wird immer **knapp oberhalb (herzwärts)** der Blutungsstelle angelegt. Die Blutsperre muß sehr fest angelegt werden, sonst werden nur die (oberflächlichen) Venen zusammengedrückt. Es kommt zur Stauung, wodurch die Blutung sogar stärker werden kann. Eine Blutsperre darf **nie länger als 1 Stunde liegenbleiben**, sonst besteht die Gefahr einer dauernden oder vorübergehenden Nervenlähmung oder einer Ischaemie (S. 53), insbesondere am Arm. Nach *einer Stunde* lockert man die Blutsperre; falls die Blutung nicht steht, zieht man die Blutsperre neuerlich für eine Stunde an. *Die Zeit der Abbindung ist auf einem Zettel zu vermerken und dieser sichtbar am Verletzten zu befestigen.*

Nicht nur Schlagaderblutungen, auch Blutaderblutungen können lebensbedrohlich sein!

Soforthilfe:

Durch Hochlagerung des verletzten Armes oder Beines und Anlegen eines Druckverbandes, oder durch Abdrücken des verletzten Blutgefäßes mittels Fingerdruck.

Abb. 7. Abdruckstellen bei arteriellen Blutungen.

Falls eine Abbindung nicht möglich ist (Kopf, Hals, Supraklavikulargrube, Achselhöhle, in der Leistenbeuge = typische Fleischhauerverletzung (**Abb. 7**), drückt man mit dem Daumen auf die blutende Stelle, u. U. legt man den anderen Daumen darüber und drückt abwechselnd. In verzweifelten Fällen drückt man

ohne Rücksicht auf die Sterilität die ganze Faust in die Wunde. Liegt ein spritzen- des Gefäß in der Wunde, so kann auch eine Klemme angelegt werden, die dann bis zur endgültigen Versorgung in der Wunde bleibt. Beim Verbinden hat man darauf zu achten, daß die Klemme nicht auf die Haut gedrückt wird.

Bei geplatzten Krampfaderknoten (hauptsächlich am Unterschenkel bei varikösem Symptomenkomplex) Kompressionsverband!!

Bei längerem Transport muß ein Wundverband eventuell nach einiger Zeit gespalten werden (vollständig bis auf die Haut), da durch die zunehmende Schwellung der Verband zu eng werden kann!

Bei Wunden an Kopf, Brust und Bauch ist an die Möglichkeit der Eröffnung der jeweiligen Körperhöhle zu denken (S. 5), bei Wunden in der Umgebung von Gelenken kann die Wunde in das Gelenk reichen.

Bei Nasenbluten (Epistaxis S. 101) legt man den Patienten flach nieder und läßt ihn die Nasenflügel mit Daumen und Zeigefinger zusammenpressen, eventuell muß man die Nasenlöcher tamponieren (nicht länger als 24 Stunden). — Bei Schädel- grundbruch (S. 89) wird eine Blutung aus Ohr und Nase nur steril verbunden.

Bei Bluthusten (Lungenverletzung durch Anspießen mit einer gebrochenen Rippe oder Lungentuberkulose) und Bluterbrechen (Magengeschwür, Ösophagusvarizen) kann man blutstillende Mittel injizieren.

Traumatische Blutungen aus der Scheide werden tamponiert, bei spontaner Blutung besteht Verdacht auf Abortus.

Blutungen aus dem Mastdarm stammen zumeist von Hämorrhoiden: ruhig lagern, eventuell Tamponade.

Bei offenem Pneumothorax, einer lebensgefährlichen Verletzung (S. 117), ist nach steriler Abdeckung die Wunde sofort luftdicht zu verschließen; dazu verwendet man am besten Heftpflaster (Abb. 8); unter Umständen muß man den Verschuß mit einer oder mit beiden Händen machen!

Abb. 8. Luftdichter Wundverschluss mit Heftpflaster bei offenem Pneumothorax.

Innere Blutungen: Nichts zu essen und zu trinken geben! Brusthöhle (S. 117), Bauchhöhle (S. 118).

Spontane Blutungen in der Bauchhöhle entstehen bei Eileiterschwangerschaft — Gefühl der Müdigkeit, zunehmende Blässe und Bauchdeckenspannung.

Sofort ins Krankenhaus abgeben!

I. Verbrennungen

Bei schweren Verbrennungen ist die Bekämpfung des Schocks bzw. Kollapses das Wichtigste (S. 15); Brandwunden werden *nur steril verbunden!* Angeklebte Kleidungsstücke nicht wegreißen, sondern abschneiden.

K. Erfrierungen

Man darf den Betroffenen nicht gleich in die Wärme bringen. Abreiben mit Schnee. Langsame Steigerung der Wärmezufuhr (S. 37). Erfrorene Stellen möglichst keimfrei verbinden.